

，日名爲アミノール，全名是 3-amino-1, 2, 4-Triazole。A.T.A 在植物體內移行性很大，可由葉面移行到地下莖根部份，而將地下莖根殺滅。每分地用量是 800g 公克，這種藥，目前在本省尚無法買到。(請靜等)

棉花種子售處




【問】：棉花種子何處有賣，一畝斤價格多少？(南投縣中寮鄉仙宰村三號徐東興)

在臺灣推廣的棉花是鐘鼎那，品種是恩派種。種子請向臺中縣東勢鄉新社村「農林廳種苗繁殖場」洽購。每公斤種子價格是二元四角，不過包裝及運費要購買者自己負擔。(熊光斗)

節瓜生育結果期

需要水分量很多

【問】：(一) 現正播種節瓜時期，花蓮方面可以栽培嗎？



(二) 多作生長期中，往往都是旱期，無法灌溉，會影響節瓜發育嗎？

(三) 在生育期中，如遇較冷溫度時，會不會影響生長？(花蓮縣新城鄉順安村陳慶春)

【答】：(一) 花蓮方面，節瓜也可周年栽培，惟夏季颱風多，應採用伏地栽培法。(二) 節瓜在生育期，需要多量水分，尤其在結果期灌水更爲充足。如冬季無法灌溉之地，則會影響其發生長勢力，瓜果發育及產量。(三) 節瓜較怕冷，如在生育期中遇低溫，則植株會停止生長，影響發育，但氣溫較暖後，瓜果即會恢復生長。(林昭雄)

節瓜種子發芽率低

由於溫度不夠所致

【問】：我從鳳山熱帶園藝試驗所得到一些節瓜種子，種的結果很成功。今後想要大面積栽培，所以將那些成功的留下十餘條做種。果實留了一個月以上，至今已割開、晒乾、淨種，結果發芽率不到十分之一，這使我非常失望，所以今天特寄了一些種子來給您們看看，是何原故。(彰化縣福興鄉二港村福正路二十號陳金火)

【答】：從寄來之種子樣本及來信看，節瓜種子發芽不到十分之一，可能由於發芽溫度不夠所致。因爲節瓜發芽時，需要高溫(攝氏廿四度至廿九度)。節瓜種子之發芽很特別，如種子本身非充分成熟，加上發芽時氣溫過低，就很難萌芽。

節瓜催芽之方法很多，也可參照農家種瓜、冬瓜或無子西瓜的種子處理與催芽方法，但要注意其發芽環境，高溫(攝氏廿四—廿九度間)及水分適度。農家也可用簡單材料、紙箱、碟盆、濾紙(可用衛生紙代)、電燈、溫度計等，自製簡單之催芽定溫箱使用。(林昭雄)

韭菜種子一升育苗後

可移植至十五公畝

【問】：我種了一升的韭菜子，將來能分播多廣地？應施什麼肥料？分播時及播後應如何處理？(彰化縣溪州鄉水尾村中山二巷四號黃秋木)




【答】：韭菜一升種子，育苗後約可種植十五至十五公畝左右。若是四季韭菜花種，栽植面積就應減少(因該種分蘗力差，須增加每穴之栽植株數)。定植適期，中部爲十二月中旬至翌年二月中旬，定植時宜多施腐熟堆肥，並多用過磷酸鈣以促進根部之發育。(王進生)

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛畜藥字第003號

預防治療劑
安全新生素
SAFETY NEWLY BORAI ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售



光洋熱帶畜牧藥物廠
彰化縣線西鄉高埔路14-3號

藥農

的格合驗檢府政



能効証保 實確份成

牌東大 藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果蔬
梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七七七四話電號七九段一路民三區西市中臺