

另一種是「牛猪安」(ネグボン)。牛猪安也是很好的驅蟲除藥，同時對豬鞭蟲有很好的效果。本藥副作用很小，用法簡單，混於飼料中或飲水中給服一次就可以，市面上可以買到元山化學工業公司出品的「牛猪安」。

使用這一種藥，可收很好的效果。

注意衛生防感染

防止豬蛔蟲感染最好的方法，是殺死或洗滌豬舍內的蟲卵，或不讓豬隻吃到成熟的蛔蟲卵。請注意下列要點：

- ① 快分娩的母豬應先驅除蛔蟲，分娩前用肥皂洗滌豬體有豬糞污染的地方，尤其乳房，同時洗滌消毒豬舍，用火焰噴射消毒最好。
- ② 哺乳中特別注意豬舍的清潔乾燥，最好每隔二週用火焰噴射消毒一次。
- ③ 豬舍床面如有破損須補修，以免蟲卵蓄積。
- ④ 豬糞尿作成堆肥，利用堆肥醱酵熱度殺死蟲卵後，方可使用。新鮮的豬糞尿不宜直接施於青飼料，如果使用新鮮豬糞尿，蟲卵就留在青料上，而拿這些青料喂豬，就容易傳染蛔蟲。

怎樣促成鳳梨秋果？

黃榮瑞

農友們栽培鳳梨，常以人工促成春果，其實，調節秋果結實還比春果容易。現在正是做這種處理的適期，處理後約三十五日開始抽穗，九月至十月下旬成熟。

本省鳳梨的自然成熟，大部份集中在夏季，小部份在冬季。夏季六月至八月間，夏果盛產時，適逢雨季，田間操作不便，且工廠一時難以容納擁擠的原料，所以現在有人為的方法調節結實期，使在春季或秋季成熟。


目前人工促成春果者已較普遍，而秋果則尚少，其實調節秋果結實還比春果容易，在夏果抽穗結實後(三月下旬)和冬果抽穗結實前(四月)處理即可。此期處理因較接近自然抽穗期，所以處理效果很好。

秋果處理時期，因鳳梨心部常缺露水，如使用固體物質處理時，必需灌注少量清水(約二十至三十立方公分)。處理藥劑及用量如下：


- 一、電石粒 先把電石打碎成小粒，每株心部投入一·二公分。
- 二、電石水 把電石裝入茶壺或密閉器內，加水(水一百立方公分，電石一公分)成電石溶液，每株灌注五十至七十立方公分。
- 三、電石粉 把電石打碎成粉末，每株施放一·二公分。
- 四、NAA片 每株投入〇·一毫克片劑一片。
- 五、BOH 價格比較高，但促進抽穗效率很好。先用清水一百五十至二百倍稀釋，每株灌注二十五立方公分。

以上各種藥品都對鳳梨秋果處理抽穗效果良好，處理時間應在早晨或傍晚，但液劑在日中處理亦可。

三月下旬至四月中旬，夏果抽穗完了後，未經抽夏果的母株，或生育正常的吸芽，都可以處理結實。經處理後約三十五日開始抽穗，約在九月至十月下旬成熟。



農會時常派人來講解，新式機械，請各農戶注意。



阿福參加研究後，耕種收成，頗有進步。(好)賢真伊(謝)哩家大。頭風出國報產增。



農會明有研究班，一班設里村一母，慢通需加參家大。班究研事農入(應)趙。