

大豆新品種

臺高大雄二號

瑞文劉·雄德周·慶文劉

性敏銳。生長勢強，分枝缺點是植株軟，易倒伏。

臺大高雄二號

(一) 栽培地區：一、春作：高雄、屏東。二、秋作：高雄、屏東。
(二) 特性：高性，中熟。生育日數：春作一百至一百十天，秋作八十五至九十五天。

種植適期春作：二月上旬至二月中旬，秋作：九月下旬至十月中旬。抗銹病力強。適宜砂質壤土、鬆軟的肥沃粘土、壤土和砂土栽培。每公頃產量春作二千至二千八百公

臺大高雄一號

臺大高雄二號

近年來，國立臺灣大學農學院應用雜交的方法，育成了一批大豆新品種，與高雄區農業改良場合作舉行「後裔試驗」後，預定本年度繁殖推廣。

這是本省自己第一次育成大豆品種，最能適合本省栽培，下面先介紹其中的二種：

臺大高雄一號

(一) 栽培地區：一、春作：高雄、屏東。
二、秋作：高雄、屏東。

(二) 特性：高性，中熟。生育日數春作：九十五至一百零五天，秋作：八十五至九十五天。

種植適期：春作二月中旬至二月下旬，秋作九月下旬至十月中旬，抗銹病力強。

適合砂質壤土、鬆軟的肥沃粘土、壤土和砂土栽培。每公頃產量春作：二千五百至三千公斤，秋作二千至二千四百公斤。對日照感應性大，種皮黃白，粒形橢圓稍扁，產量高。

至十月中旬。抗鏽
。每公頃產量春作
二千至二千八百公
斤，秋作二千至二
千五百公斤。對日
照的感應性敏銳。
分枝多，着莢密，
豆粒大，種皮黃白
包，粒形橢圓，產
量高。缺點是植株
軟，易倒伏。

正豐公司

又一新貢獻！

對植物生長上必須

之最新綜合微量要素


肥料！

大豐收肥素

—施用大豐收肥素—

問世了！

良改乏欠之素要量微給補量收加增能
病息窒稻水防預長生物植進促，壤土
葉落果花落落對並病枯立及(病萎黃)
效特存具等根敗



正豐化學股份有限公司

臺灣、霧峯、電話六三號



商標



註冊