

植物促進生育劑

效果確實
信用可靠

應供貨現

2571

總經銷：

信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號

來信請用明信片
寫真實姓名住址
信正面註「農問」
信中免寫客氣話

營養不良羊體衰弱


抵抗力低容易得病



【問】：我養了一群羊，因乏經驗，故有疑難請教：
一、羊群淋雨後，其中有三隻病了，呼吸急促，叫聲悲慘，不能走動。五、六小時後，二隻大的漸漸復原，但小的一隻死了。二、有些小羊，出生後六、七天內，尚活潑，二十多日後就死了。
三、健康的羊，忽然不吃，行走不便，肚子脹得如鼓，五、六小時後即死亡，有一隻也是同樣的情形，但三天後全癒，不過左腹凸起一個雞蛋大小的肉球。
四、羊下稀黑色糞便，不吃。以上敬請賜教（高雄縣旗山鎮武鹿巷六號向國英）

【答】：一、根據你信上所述情形，你的

羊可能是平常營養欠佳。其原因或許是患內寄生蟲而引起體質衰弱，對外界刺激則少抵抗力。因此遇到下一陣雨後即生病，普通健康的羊遇雨是沒有什麼關係的。
二、三隻山羊患病後，一隻小羊死亡，其症狀是呼吸困難而行走不便。是否與你的（三）項所說，有點鼓脹現象？否則，也許是淋雨後小羊發生肺炎。故淋雨後，如發現有異狀的羊，應該放在羊舍內保溫，打一點強心劑，如體溫高時，還要用解熱劑及抗生劑的藥品。
三、第三點的現象有鼓脹現象，此外還因寄生蟲而引起。腹部右邊突出大腫塊，是否為主要原因，須檢查後才能確知。
四、下稀糞為黑色，可能①寄生蟲引起②腸加答兒，要給健胃藥，止瀉給，強壯劑，如有寄生蟲，還要給驅蟲藥。
五、我建議你快請比較好的獸醫診斷。全群山羊要驅蟲一次，多注意營養，除吃草外，稍給一點補助營養飼料。（黃立群）



信用唯一誠實最可靠種子專家

嘉 義 清河精選優良種子

- 金瓜子(木瓜型)
- 大號兜尾菲菜子
- 美國大五寸人參子(胡蘿蔔)
- 美國球型洋蔥子
- 美國大心萬宜
- 美國加州大粒甜椒子
- 荊芥子(京芥子)
- 日本新理想莢(耐熱抗病力強早晚通用)
- 日本長岡一號甘藍菜子
- 日本長岡福壽二號トマト
- 日本長岡福壽大型トマト
- 日本瀨野川牛蒡子
- 全年開花菲菜子
- 虎耳荷莖菜子
- 苦瓜子(粗米)
- 千草子(蒜粉子)
- 胭脂長茄子
- 特選想樹子
- 蘋果型トマト
- 清江白菜子
- 益農素(促進發育健根健機增加收量)
- 日本四葉胡瓜子
- 富研西瓜子
- 一條根白菜子
- 大號應菜子(空心菜)
- 尖葉小號應菜子(空心菜)
- 紅仁白格二尺半長菜豆子
- 臺中種產紅仁白格白豆子
- 日本ニローン子
- 新型梨仔瓜子
- 北京劍菜結頭菜子
- 50天短種蘿蔔子(交春後可下種)
- 福特好(矮性皇帶豆子)
- 日本タキイ照葉系美農大根蘿蔔(舊曆二月中旬下種)
- 新夏秋35天包心白菜子
- 白花芥蘭子
- 80天油菜子
- 水上產青皮竹筴黃麻子
- 赤皮黃麻子
- 綠肥用太陽麻子
- 南洋田菁子
- 南畔州早大白紫蘿蔔子
- 美州早大白紫蘿蔔子

敝行尚有中藥中之只蘇子生地種等歡迎照會


其它未刊載種子尚有歡迎照會，特效農藥東和牌噴霧器等歡迎光臨賜顧。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號



棉花栽植適期



卷十二號之一(沈榮生)

【答】：棉花播種種子，每分地約一·五至一·八公斤。

棉花播種時期，因各地氣候條件之不同而異。海拔不同之山地，氣候頗不相同，因為不明瞭你住處之氣候條件如何，所以不能告訴你確實的播種期。不過可告訴你一個決定其播種期之原則：

棉花生育期間(自播種至收穫完畢期間)約為一八〇天，在這一八〇天中，不能遇着霜期。生育前期(發芽至生育約一〇〇天左右)需要適當之雨量，生育一百天以後，則需要乾燥的天氣。宜蘭九月以後多雨，所以預定要在九月時收穫完畢，故其播種期應儘量提早，但棉花發芽，氣溫需要達到攝氏十八度以上。山地春寒，且可能會有晚霜；所以必定要在晚霜期後，氣溫達到攝氏十八度以上時才能開始播種；時期大概是在清明谷雨之間(觀光斗)。

茶樹臺刈部位

六至九公分最適當

【問】：我是個茶農。

前幾年修剪茶樹，因留得過長，壓條時發生困難。想把它剪短一點，留約二英寸高。但因會看見有些茶農就是因為將茶樹剪得太短而使茶樹死去，不知究應如何好？又修剪是在什麼時候最適當？(苗栗縣通霄鎮城南里一三三號徐阿進)


【答】：臺刈部位，以離地面六至九公分

(約二英寸至三英寸)最為適當。如臺刈部位太高，萌芽雖然迅速，但易於再衰老。同時切口要平滑斜面，大約是四五度。斜面宜朝南或東南方向，切口絕不可粗糙破裂，否則發牙困難，易於枯死。

臺刈前一年，應多施用鉀質肥料及有機質肥料，增加養分，減少茶樹枯死的機會。所以離地面二英寸(六公分)處臺刈，是適當的。若照前述方法臺刈，則茶樹不容易枯死。用衰老的枝條壓條是比較困難，同時所得幼苗亦不強壯，因此臺刈後一至四年生的枝條，適合於壓條，再過後就較困難。茶樹剪枝的適當時期，是全年茶季終了之後，就是說在十一月下旬至一月上旬為適當時期，農曆冬至前後是可以舉行剪枝的。(徐英祥)

豬仔內寄生蟲

引起營養不良



【問】：(一)豬仔約廿三磅，發育很好。飼養至七十五天，忽染嘔吐，而後頭部不能平直。請獸醫診斷，據說可能是感冒性肺炎，結果二天就不治。解剖後獲見小腸內一肚子蛔蟲，實在很可怕；大小一共有廿八尾之多。請



問蛔蟲會引起肺炎嗎？什麼藥蟲藥最有效而安全？(臺南縣學中鄉頂州村四〇號黃明義)

【答】：據你所說的情形，你的仔豬死亡，是由於患蛔蟲病太厲害所致。內寄生蟲厲害，可使營養不良，頭部會發生僵硬現象，但不至發生肺炎。驅蟲藥以氟化鈉效果甚佳。驅蟲藥，各農會均有代售，請就近農會洽購。至於驅蟲藥之用量，應照仿單說明給與。(李登元)

大肥啾

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，農會均售



促進產卵 預防疾病



益源製葯所
台北市羅斯福路三段二七二號




興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新路五九號
電話：2619-4688
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號
電話：38226

新設計中耕除草機

可向鄉鎮農會洽購




【問】：貴刊第十三卷第二期，刊出新設計的禾稻中耕除草機，不知單輪三行和兩輪三行的，一台價錢各多少。(南投縣中寮鄉和興村永樂路一六五號周添福)

【答】：中耕除草機每架價格如左：
單輪三行型，二百五十元至二百八十元。
單輪三行型，三百四十元至三百七十元。
兩輪三行型四百元至四百三十元。本人現正與農機具工廠洽商製造，委託鄉鎮農會代銷。(江天送)

稻種催芽適溫

攝氏三十七度左右



【問】：一、稻種催芽之適溫及最高最低溫度如何？
二、如果在三十七度(攝氏)之常溫下，繼續十二小時，對發芽有否影響？

【答】：一、稻種催芽最高溫度為攝氏三十八度，最低為攝氏二十五度左右，始可達到催芽之目的。
二、在攝氏三十七度之常溫繼續十二小時，對發芽無不良影響。普通在攝氏三十七至三十八度之溫度，經過十小時左右，就開始萌芽。
三、西瓜種子催芽在攝氏三十七度時，稍嫌過高。普通在攝氏三十二至三十五度，發芽情形良好。(王進生)

魚「着箭」的防治法



【問】：一、一般池塘所養的淡水魚，有什麼病蟲害？在魚的口內表皮上，有一種寄生蟲只有線頭樣大小，形狀像箭，箭頭插入皮內，有五分長，俗稱「着箭」的。這種現象是怎樣發生的？怎樣才能消滅？已得病的魚要怎樣才能消除？是否能傳染他種魚類？(苗栗縣苗栗鎮新英里八十一號邱建仁)

【答】：一、各種淡水魚所害的細菌性傳染病或各種寄生蟲類病害很多。
二、你所說的「着箭」，是一種叫做蝨蟲的甲殼類寄生蟲，寄生於魚類身體上。尤其是白鰻、大頭鰻及鰻魚，被寄生較為厲害。幼魚期時代，因此而致死亡的為數很多。驅除此種害蟲最好的方法，是使用濃度一百萬分之一至三三的滴滴涕(DDT)或西德拜爾工場出品；或者用濃度一萬萬分之〇.五至〇.八BHC也可，惟後者對池魚的安全率較低，使用時應特別慎重。
附藥劑量計算方法：
三三滴滴涕 100 克 × 池水體積 × 濃度 × 1000
行發成分 (唐允安)

氣化銨肥效

與硫酸無顯著差別



【問】：最近市面上有售二五〇水牛牌「氣化銨」肥料，該肥料是何物製成？與硫酸銨的成份和肥效，是否一樣？能否使用於各種作物？(臺東縣鹿野鄉瑞源村五號鄧運昌)

【答】：該品可能就是本省調味工廠製造味精之副產品。氣化銨所含之氮，與硫酸銨同是銨態氮，肥效無顯著差別，適合於各種

◎供 應 中 藥 種 子、種 苗

敝行爲擴充中藥起見，已由國外採入左列優良種子、種苗，貨到不多，敬希從速定購

△種子部份：枸杞、白芷、木香、澤瀉、當歸

△種苗部份：當歸、麥門冬

註：一、中藥價格表待索即寄
二、中藥栽培法對於未悉顧客，備有贈送(附八角郵票)

◎日本產優良一代交配蕃茄種子

一、日本大和農園出品：福壽大形、ひかり、
一代交配蕃茄新原
一、日本高山種苗株式會社出品：高農一〇
一代交配蕃茄、高農八號、福壽二號
早生世界一、三元世界
一、日本武藏農場出品：東光、彌生極早、大
一代交配蕃茄、寶光、麗光
註：一、右記蕃茄種子每包(二〇公分裝)特價
四元、每包三〇公分裝、探購時請利用本行
郵政劃撥號四四八四號

大信農產行
臺北市迪化街一段二二九號
電話：四一八五九號

特 點：

一、絕無藥害(據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
二、藥效優秀(據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
三、提高產量(據50年度臺中區農業改良場試驗報告)

在來種稻熱病特效藥

中區農業改良場試驗報告
告在無發生病害區使用
結果增收七%

注意：避免與安特靈等有機
藥劑混合最好單獨
使用。

製造元：
日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕隆商行
臺中市建國路一六七號
電話：四八五五號

展着劑の王ミカサ展着劑 (リグトン)

預防稻熱病、窒息病
請 採 用 ↓

植物生長賀爾蒙劑

一週豐

液劑 高單位新製複合劑

主 成 分
芳香族吡嗪
化合物外數種

100g

奇特企業股份有限公司

全省各農會、農藥行、種子店均售

五豐化學工業股份有限公司

榮譽出品

富粒多

FOLIDOL E-605



與德國拜耳藥廠獨家技術合作

防治：水稻、棉花、鳳梨等蟲害

大利農

DIAZINON



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：香蕉鳳梨粉介殼蟲、洋菇之蒼蠅、蔬菜害蟲、環境衛生之臭蟲蚊蠅及蟑螂等。

克羅萊


CHLOROBENZILATE



與瑞士嘉基藥廠獨家技術合作

防治：柑桔茶葉等之紅蜘蛛卵及成蟲等

上項農藥經農業試驗機關實地試驗認為最優良之農藥，為五豐化學工業股份有限公司榮譽出品，公司：臺北市中正路 1791 號二樓，本公司及各地經銷商青果合作社省農會及各地鄉鎮農會均可購得。



處理種莖生長良好

【問】：一、有些

農友，將種莖、蒜種等，浸生尿後，種植本圃或苗床催芽，究竟原因如何？有無試驗結果？

二、用其他植物生長促進劑、來處理

種莖、蒜種、效果如何？（彰化縣福興鄉麥厝村一號許水代）

【答】：一、人尿中含有促進植物生長之荷爾蒙，並含有尿素。故經處理過之種莖及蒜種，均發芽生長良好。至於處理的成績如何，本省尚未作過試驗，無法舉出數字來證明。

作物。惟所含之氮，對某些作物如菸草等不太相宜，祇可少量施用。（王君穆）

尿中含有荷爾蒙

二、用愛多收浸漬種莖、蒜種，也可獲得與生尿處理類似之效果，其濃度宜用六千倍液，浸漬時間約十六小時左右。（王進生）

省物資局

推廣綠皮苦瓜

【問】：貴刊所刊「綠皮苦瓜耐運輸」乙

則，敝人對此很有興趣。但不知現在市面上有綠皮苦瓜種子出售嗎？一分出需多少種子？（彰化縣大城鄉上山村大山路劉萬長）

【答】：綠皮苦瓜，臺灣省物資局推廣，請向該局接洽。鳳山熱帶園藝試驗分所，現正在繁殖中。（郁宗雄）

讀者服務部小啓

陳爐 吳士賢 劉文鐘 魏火焰
賴呈鈞 楊登連 張吉雄 許永祿
廖運灶 陳崎 葉深潭
以上各位農友的問題，已送請專家研究，請等本社的覆信。

尿素

尿素肥效等於硫酸銨 2.2 倍
尿素中性連續使用保證無害

—其他化學肥料—

尿氮化鈣 過磷酸鈣 磷酸銨鈣 化成氮磷

成份保證 肥效最大



台灣肥料股份有限公司

台北市街電路九十一號 電話：二五六四一—