


棉花栽植適期



卷十二號之一(沈榮生)

【答】：棉花播種種子，每分地約一·五至一·八公斤。

棉花播種時期，因各地氣候條件之不同而異。海拔不同之山地，氣候頗不相同，因為不明瞭你住處之氣候條件如何，所以不能告訴你確實的播種期。不過可告訴你一個決定其播種期之原則：

棉花生育期間(自播種至收穫完畢期間)約為一八〇天，在這一八〇天中，不能遇着霜期。生育前期(發芽至生育約一〇〇天左右)需要適當之雨量，生育一百天以後，則需要乾燥的天氣。宜蘭九月以後多雨，所以預定要在九月時收穫完畢，故其播種期應儘量提早，但棉花發芽，氣溫需要達到攝氏十八度以上。山地春寒，且可能會有晚霜；所以必定要在晚霜期後，氣溫達到攝氏十八度以上時才能開始播種；時期大概是在清明谷雨之間(觀光斗)。

茶樹臺刈部位

六至九公分最適當

【問】：我是個茶農。

前幾年修剪茶樹，因留得過長，壓條時發生困難。想把它剪短一點，留約二英寸高。但因會看見有些茶農就是因為將茶樹剪得太短而使茶樹死去，不知究應如何好？又修剪是在什麼時候最適當？(苗栗縣通霄鎮城南里一三三號徐阿進)


【答】：臺刈部位，以離地面六至九公分

(約二英寸至三英寸)最為適當。如臺刈部位太高，萌芽雖然迅速，但易於再衰老。同時切口要平滑斜面，大約是四五度。斜面宜朝南或東南方向，切口絕不可粗糙破裂，否則發牙困難，易於枯死。

臺刈前一年，應多施用鉀質肥料及有機質肥料，增加養分，減少茶樹枯死的機會。所以離地面二英寸(六公分)處臺刈，是適當的。若照前述方法臺刈，則茶樹不容易枯死。用衰老的枝條壓條是比較困難，同時所得幼苗亦不強壯，因此臺刈後一至四年生的枝條，適合於壓條，再過後就較困難。茶樹剪枝的適當時期，是全年茶季終了之後，就是說在十一月下旬至一月上旬為適當時期，農曆冬至前後是可以舉行剪枝的。(徐英祥)

豬仔內寄生蟲

引起營養不良



【問】：(一)豬仔約廿三磅，發育很好。飼養至七十五天，忽染嘔吐，而後頭部不能平直。請獸醫診斷，據說可能是感冒性肺炎，結果二天就不治。解剖後獲見小腸內一肚子蛔蟲，實在很可怕；大小一共有廿八尾之多。請



問蛔蟲會引起肺炎嗎？什麼藥蟲藥最有效而安全？(臺南縣學中鄉頂州村四〇號黃明義)

【答】：據你所說的情形，你的仔豬死亡，是由於患蛔蟲病太厲害所致。內寄生蟲厲害，可使營養不良，頭部會發生僵硬現象，但不至發生肺炎。驅蟲藥以氟化鈉效果甚佳。驅蟲藥，各農會均有代售，請就近農會洽購。至於驅蟲藥之用量，應照仿單說明給與。(李登元)

大肥啾

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，農會均售



促進產卵 預防疾病



益源製葯所  
台北市羅斯福路三段二七二號



興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新路五九號  
電話：2619-4688  
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段46號  
電話：38226