


# 顧照心小·產生猪母



水 金 鄉

一頭母猪，每年可生產兩胎，每胎生產仔猪七至十二頭，對農家收益貢獻很大。可是，飼養母猪所遭遇的困難也較多，尤其以母猪生產期前後的飼養管理和仔猪的照顧最為重要。

飼養母猪，如果不小心照顧，可能招致流產、難產、死產，或引發子宮內膜炎、產褥熱、仔猪下痢等各種嚴重疾病，損失金錢。下面將有關母猪生產前後的飼養管理注意事項，介紹給各位參考：


## 確定生產時期

- 母猪臨產時，必呈下列的幾種症候：
- (1) 外陰部：臨產前十天左右，外陰部特別腫脹且潮紅。
  - (2) 乳房：母猪一般在生產前三、四天左右的，以手輕摩乳房時，可搾取乳白色乳汁，同時乳頭呈赤褐色。
  - (3) 食慾：母猪臨產前不思進食。

- (4) 舉動：生產前幾小時的母猪，時常將乾草堆集一處築巢，供生產仔猪之用。
- (5) 精神：生產前二至三小時，不喜歡走動，同時在生產仔猪前一至二小時，腹部開始陣痛，起臥不定。陰部流出破水粘液，即表示離生產期不遠。

## 準備場所用具

- 生產前須要準備下列的幾樣事情：
- (1) 生產預定日（懷胎後一百一十四天左右）前兩三天，將猪舍清掃水洗，並行消毒，同時改換新稻草作敷草（敷草必須切成三、四寸長，不可過厚），否則小豬易被壓死。
  - (2) 生產前二至三天，母猪飼料給與不可過飽，以防止生產時發生困難。
  - (3) 猪舍二邊應架設仔猪棚，防止仔猪生出時被母猪壓死。仔猪棚寬度一臺尺至一·五臺尺即足，高度視母猪大小而定；大者較高，小者較低。
  - (4) 冬天應特別注意防風設備；能在牆角設一保溫架最好，其作法是在牆角用木桿欄住，在欄內掛電燈，供仔猪保溫之用。如有便泌時，須多給青菜類。
  - (5) 夏天猪舍四邊應開放，使通風涼爽，地面應時常灑水，午間特別熱時應給與水浴，同時應多給青飼料。
  - (6) 生產前，飼養管理者應時常親近母猪，並時常按摩母猪腹部，拭擦皮膚，以免生產後發生惡仔猪吸乳的現象。
  - (7) 發現生產症候時，應不分晝夜地察看其活動情形，最好每半小時至一小時察看一次，如見橫臥，即表示已臨分娩時間，必須看守在旁，以便助產。
  - (8) 生產時須要下面的幾種用具，應事前準備，以免臨時尋找不易。
    - 1 消毒脫脂綿，稀碘酒（供臍帶處理之



預防注射正應該  
霍亂發生真利害

小正  
顧和  
圖文

，意注着食飲天夏  
，意注着水食冷  
，意注着滿滿菌如霍  
，視重上毒消件物

，病染傳亂霍生發  
，意注着生衛境環  
，除滅着（蟻）；於加（繩套）神何  
，氣清要所廁獨猪

，害利真生發亂霍  
，財萬千失損家國  
，該應不慌心姓百  
，災天降公天是不

- (1) 清潔乾燥細布(最好質軟，並經洗滌乾淨)，供拭淨小豬之用。
- (2) 消毒水或肥皂臉盆(供消毒母豬陰部之用)。
- (3) 肥皂箱(裡面放些切斷稻草，將生產後的仔豬放置於木箱內，以免被母豬壓死)。

## 產後如何處理

- 仔豬生出時，應處理下列的幾個事項：
- (1) 仔豬生出後，應將不潔物拭淨，然後放入肥皂箱內休息。仔豬鼻尖周圍的粘液應即拭除。
- (2) 最先生出的仔豬，經拭淨後，最好再放回母豬頭部鼻尖，與母豬親近，使母豬安心繼續生出仔豬。
- (3) 母豬生產時，應該保持周圍安靜。
- (4) 母豬生產，因消耗體力而疲勞，應給與一些麥麩與清水。冬天天氣寒冷時，清水應加溫給飲較妥。
- (5) 母豬生出最後一頭仔豬後三十分鐘到一小時，胎衣就會下來，此時應將胎衣拾起，放到豬棚外以待埋蓋。胎衣如被母豬吃下，可能養成母豬吃仔豬的惡癖。仔豬和胎衣完全生出後，應再以消毒藥水洗滌母豬外陰部，防止細菌感染。如果有小裂傷時，應即塗上紅汞液和配尼西林軟膏，嚴重者應立即請獸醫行縫合手術較為安全。
- (6) 仔豬吸乳位置的選定，是仔豬生產後的最重要工作，因為吸乳的位置，對仔豬發育有很大的影響。

一般母豬，前半部的乳房乳線較為發達，乳分泌量也較多，因此，在未選定吸乳位置之前，應將體弱細小的仔豬，放置於前半部較有乳量的乳頭，這樣可使仔豬發育平均。吸乳位置的選定，只要以人工方法矯正二、三天，就可以完全習慣了。

(7) 在來種母豬的生產頭數，比雜種或盤克夏種多，因此常有乳頭不足的現象發生。此時應將體弱或畸型的淘汰，以保護健全仔豬的安全。

(8) 生產後一、二天之間，母豬外陰部會流出赤色粘液，有時還會變成黃白色。這是正常的現象，經過三天後即可消失，陰部也同時縮小。但是如有濃汁流出時，必須請獸醫診治處理。

(9) 農友們飼養母豬，多用甘薯或殘飯等做飼料，以致營養不平衡，或致過肥。此時生產，特別需要注意照顧，因為「脂肪豬」最容易遭到難產或外陰部裂傷，仔豬不能生出而死在腹內。有的母豬因初產不諳仔豬哺育，精神過敏，以致壓死或踩死仔豬。在此情形下，飼養者應加倍照顧母豬，如果有困難，應及時延請獸醫師等協助處理。

## 蓖麻

### 與


## 咖啡

△巴西、印度與南非，為世界蓖麻籽出口主要地區；巴西產量佔世界的百分之三八·九，印度佔二六·七。

△全世界蓖麻子產量約五十六萬噸，美國每年消費約十二萬噸。

△蓖麻適宜熱帶或亞熱帶生長，臺灣可以種植，每公頃產量可達二千二百五十公斤。

△非洲主產咖啡地區有三十處，第一次世界大戰期間，每月平均約產一萬五千噸，佔世界產量百分之一點三，一九一八年後經咖啡工業與咖啡農的努力，在二十年中增產十倍，計產咖啡十七萬四千噸，一九四四到四五產量再增為十九萬八千噸，佔全世界產量百分之十五。就是說在四十二年中，非洲咖啡增產四十五倍，在最近的十年，增加的最多。(汪楷民)



，化變的代時明文  
，射注着亂霍防預  
，行家大知通到接  
。(痛怕) 痛驚講去無通法

，去免喚(熱發) 燒發(孩小) 仔因  
，除免可 (娘妊) 肚大其查  
，醫家大射注防預  
。錢罰要注無是那

，(錢金損) 財錢了亂霍生發  
，該應正射注防預  
，(哭天是不) 害人加公天是喚  
。害利真染傳菌細