

番茄種子洗曬及貯藏法



【問】：處理蕃茄種子時，等果實在樹上紅了再摘下來，將種子洗好後，拿到日光下曬。為了防止日光過於強烈，用草蓋在上面，等到曬乾了，再用布包好，收藏起來。到冬季育苗的發芽率才達三成，是何原因？（臺中縣后里鄉鄭南村枋寮路十七號（鍾清鏡））

【答】：一、你的種子洗曬及貯藏方法均有問題，請用下列方法較好。由果肉榨出之種子，宜與果漿貯在瓶或木桶內，經過發酵，至種子之膠物浮成一層白膜，始可洗淨。將洗淨的種子，放在室內風乾一二天後，再用間接陽曬方法，曬至充分乾燥為止。因水分尚未風乾之前，即使用間接陽曬法，其種子內之溫度會昇高，而影響其發芽力。二、種子充分乾燥後，宜貯藏在玻璃瓶內或玻璃乾燥器內，並須密封瓶口，以杜絕空氣之侵入，避免增加水分，使種子完全休眠。（王進生）

洋菇澆水時添尿素

對增產效果很小



【問】：洋菇生產率漸降的時候，澆水時是否可以添些尿素？最多可添多少？

加工用豌豆

各地均可栽培

【問】：①加工用豌豆三個品種，本省北、中、南部，各以栽培何種為宜？
②溫度如在攝氏十五度以下時，會不會影響着莢率與生長呢？

③木作物種植後，會不會影響次期作物種植期呢？（雲林縣西螺鎮吳厝里92號廖世用）

【答】：①在北、中部，以溫內達，林貢為佳，南部雖還未試作過，但也以溫內達及林貢為宜。萬豆生長期間較長，但較耐熱，若無輪作的關係，各地均可栽培。

②三種加工用豌豆，雖喜歡溫暖的氣候，在攝氏十五度以下之溫度，也能生長着莢，故在本省，這三種受霜害之程度，較在來品種為輕微。

③不會影響後期之水稻插秧。若有必要提早時，只要在第二期水稻收穫前十天，作摘仔栽培就好。（王進生）

西瓜種子催芽溫度



【問】：西瓜種子催芽時，溫度須保持幾度？（雲林縣二崙鄉楊賢村五隣六號李水波）

根菜類不宜連作

【問】：一、種過紅蘿蔔的土地，是否可以再種蘿蔔？

二、何時種紅蘿蔔是時價最高期？

三、番茹何時種植，最合時價最高期？（臺北縣士林鎮溪山里六二號之一號邱紹源）

【答】：一、根菜類連作不太適宜。若前作胡蘿蔔未曾發生腐敗病及菌核病，其後作種蘿蔔還可以。

二、以紅蘿蔔最高經濟價值之生命而論，約在六月下旬至七月播種為宜。

三、番茹在九至十月，價錢最高，故須在七月上旬，用塑膠鉢育苗（集中育苗），定植於有防風設置之地點，始可生產。為其若果良好計，宜用植物荷爾蒙，例如愛多收或番茹多旺等，處理花房。（王進生）

特點：

在來種稻熱病特效藥

一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）
二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）

三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）

在無發生病害區使用結果增收7%
注意：避免與安特靈等有機藥劑混合最好單獨使用。

製造元：

日本三笠化學工業株式會社
總經理 裕隆商行
臺中市建國路一六七號
電話：四八五五號



(錠ン一ネコイダ)



永祥牌

油機 柴發 油油 輕柴



永祥牌發動機抽水機製造
抽水工程包辦
各種外國製發動機
日製鈴江耕耘機經銷處

FB75型 柴油發動機
AA型
YAB型
C 輕油發動機
歡迎選購
供應

型 式	馬 力	迴轉次每分	耗油量一小時 輕油 加 侖	重量
YH.A型	3-4HP	1500-1800rpm	0.22	70K
YH.B型	4-5HP	1000-1200rpm	0.30	90K
YH.C型	5-6HP	1000-1200rpm	0.38	110K
YH.D型	7-8HP	1000-1200rpm	0.42	133K

永祥機品工廠

榮譽出品

店址：臺灣省嘉義市新榮街151號 電話：2167
廠址：臺灣省嘉義市永和街88號 電話：2453