


微量元素葉面綜合營養劑

元始型、粗養、粗大
養根、養穢、防止落花、落果



1. 原料：石原トランスプラントン、フルートン，室素、微量元素生長促進劑數種外貨分裝。
2. 防止霜害：夜間降霜嚴寒時將「養強」加水 500 倍至 1,000 倍使用於一期秧苗者能免受霜害。
3. 說明書函索即寄
石原産業株式會社總經銷處
吉本農化企業社監製
臺中市民權路 132 號 TEL 3691

荔枝幼苗開花
是不正常現象



【問】：本人

所種荔枝，是去年雨季前用接枝苗栽植，曾在苗穴下放植堆肥和富粒多液殺菌後始栽。迄今

尚不足一年，部份曾天枯，但大部份已成活。沒想到尚

不足一年的幼苗，現已開花，本人急折去花，不知是否有損作物成長，如不折去，是否有益，盼見示。（臺南市公園路五十一號張忠義）

【答】：荔枝懸條時，因需先在枝條基部，作環狀剝皮，阻止養分往下運輸，而貯積于環狀剝皮部位之上部，促使生根。普通經過四個月，生根即可充分，并剪下撫育。但有時經過六個月以上，尚不剪下，或經過乾季數個月後方剪下，在此情形下，枝條中

貯積之水化合物礦極爲豐富，有利花芽形成。此種懸條種植後，如任其乾燥，素缺乏氮肥料之供應，氮氣比植，始終保持其高者，則至開花季節，即行開花。這種開花是不正常現象，宜予摘除，同時注意幼苗之灌水與施肥（多施氮素肥料），使其發育旺盛，則不正常之開花可以避免。（張振甫）

果苗定植時

根系需自然開展

【問】：我最近買柑苗數百枝，發現柑苗大根打一個結。請問該結必須剪開嗎？（臺北縣石門鄉茂林村坪林四四號許永盛）

【答】：任何果苗，定植時均需使根系自然開展，不可捆綁或打結。其過長者，剪短一部份亦無妨。故柑苗之根打結者，應予剪開後定植。（陸之琳）

讀者服務部小啓

林明傳、譚伯偉、黃文來、詹仁泓、陳茂德、洪政信

以上各位農友的問題，已送請專家研究，請等本社的覆信。

一致養雞·豬·鴨的各農家的好消息——

防治貴家禽畜疾病、把牠們 餵肥養大、增產優良的蛋·肉

這就是增加貴家收入唯一的近路！

費用僅小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新禽畜驅蟲藥

預防／治療，雞病的特效藥

動物用


動物用

禽畜也和人一般，體內若有蛔蟲寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃而看牠們一天比一天的肥大。

【包裝】 30公分，100公分，500公分，

對家雞患染的一切疾病有顯著優秀的特效。雞在雛時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大

【包裝】 50公分，100公分，100片他



田辺製藥

全島有名藥店發售