


# 當心母猪難產



宣 欽 游

母猪發生難產的機會比其他家畜少，但是也因個體、遺傳、飼養管理欠妥、過肥、運動不足以致難於吸收維他命丁，並在分娩時影響骨盤開闢而發生難產，不能不注意。

## 原因

**陣痛微弱** 老衰母猪，運動不足過肥，或因營養不良體質虛弱而發生。

**產道狹窄** 未達繁殖體重就開始配種受胎，誘起生殖器和肌肉發育不全，或幼弱陰門、陰、子宮、骨盤都狹窄，以致分娩時胎兒難出生。

**胎兒過大或異常** 飼養管理欠妥，碘分缺乏，胎兒過大（通稱無毛豬或紅豬），或出產時胎兒死在腹內不能隨陣痛生出。

## 症狀

母猪分娩前，外陰部呈紅腫，乳房膨大，分泌乳汁和作巢，分娩時間漸漸接近，母猪精神不安，時常起臥或徘徊舍內，但已發生陣痛，如不能分娩仔豬，橫臥疲倦苦悶。

## 治療

先用微溫肥皂水灌腸，剪修指甲，用來蘇液消毒手掌塗布洋橄欖油，手型如楔狀緩慢插入產道，探測骨盤有無開闢，或胎兒有無到達骨盤口。如觸胎兒頭部或腹部在骨盤口，即把胎兒頭部或腹部按捉，並隨母猪陣痛努力慢慢牽出。假使陣痛微弱，胎兒尚未推達，骨盤產道狹窄，此時宜用腦下垂體後葉荷爾蒙製劑ビチリン一・五至二立方公分（二五至二〇公厘）注射肌肉，促進陣痛。如果經過五至十分鐘胎兒仍未分娩，即用亞麻油或橄欖油二合（三百六十立方公分），放於三至四倍熱水中，充分煮沸後加倍量溫開水，為攝氏三十九度，用橡皮管插入產道至子宮內（二十至二十公分），將上項混合油注入，然後用消過毒的手慢慢插入，捉定胎兒頭部或腹部牽出。難於捉定時即用產科鉤（鈍鉤）鉤胎兒眼窩或口內下顎，順着母猪努力時慢慢牽出，以免傷害產道。牽出一頭後如仍停滯，須助產至胎兒全部分娩，胎盤全落為止。

如果骨盤發育不全產道狹窄，最後要施行開腹手術（帝王切開）；須請熟練獸醫施行。

助產分娩後，必須用二〇%來蘇水洗滌陰部，注射配尼西林六〇至九〇萬單位，磺胺劑，強心劑等，並給與容易消化的飼料混合米酒一碗。

分娩後數日間，也須用二%硼酸液或鏈黴青霉素二支，溶於微溫開水二千至三千立方公分洗滌子宮，以免子宮發炎。

## 預防

一、母猪生後十個月以上，體重一百公斤以上，且發育良好才可以開始配種（但外國品種須體重一百三十公斤以上）。

二、飼料要合理配合，必須給與充分的蛋白質、礦物質和維他命。過肥母猪應減給澱粉質飼料，供給多量牧草、青菜，以防止脂肪沈着。

三、每天給母猪運動一至二小時，吸收新鮮空氣和太陽的紫外線，使內臟生殖器肌肉發育良好，所以飼養母猪的農友，必須有運動場的設備。

派員實右不應諺

• 中禾 •



拜拜要尾莊頭(村)莊  
，得猜開戶人家家  
(事)代博可錢無土阿  
。排鋪來借後借前

，排鋪來借後借前  
，真雞引舖引  
(富豐)派兵，婦子合反觀知  
。來請(都)龍於阿瑞阿

，來總龍於阿瑞阿  
，來開城一開擺大  
(次一又次一)載車請包小包