

石刁柏初產期， 需否留莖葉？

— 生 進 王 —

本省二年生的石刁柏，從三月中旬就有嫩莖（白筍）發生。你可知道，這些初期產生的嫩莖，究竟應保留讓它伸長成爲莖葉，或全部採收供食？

本省現在栽培石刁柏的農友，都讓二月中旬至三月上旬所發生的嫩莖，伸長成爲莖葉，所以，在這一月份的期間，因受莖葉成長而消耗貯藏根內的養分，到四月下旬以後才有大量嫩莖發生，影響初期產量很大。下面將和你討論有關這一方法的得失。

不留莖葉 · 儘採嫩筍

美國、日本等國栽培石刁柏，在採收期間都不留莖葉，將所發生的嫩莖全部採收。

以本省的氣溫條件，二年生的石刁柏，從二月中旬就有嫩莖（白筍）發生。這些嫩莖，是由前一年蓄積於貯藏根的養分所形成的，所以，隨着嫩莖的發生，貯藏根內的養分漸次減少。

如將二月中旬發生的嫩莖繼續採收，到五月中旬左右，因爲貯藏養分減少，嫩莖變爲細小，應停止採收。在這一時期，不留莖葉，只靠前一年所蓄積的養分形成嫩莖，這是英國、日本所採用的方法。

在本省，這種方法雖在嫩莖生產初期可獲大量產量，但採收期間產量較低，不過另有優點，即因五月中旬以後本省進入颱風季節，嫩莖採收期間不受颱風影響，而且不受洪水積水的影響。所以，在河川地易受洪水氾濫的地區，應做做美國、日本的方法，因爲洪水氾濫後，對嫩莖發生影響很大。

保留莖葉 · 兼顧嫩筍

做做「綠竹筍」，留部分莖葉後採收嫩莖。這種方法，在本省很普遍，但是所留莖葉過多，不但影響初期產量，且因形成莖葉幾乎將貯藏根內養分消耗一半。

據觀察結果，二月中旬至三月中旬的嫩莖較大，所以不應全部犧牲留作莖葉，但是二月至五月的氣溫很適合石刁柏的同化作用，也應留二三莖葉，以利光合作用，造成養分，補給由嫩莖發生所消耗的養分。

這種方法，一方面顧及初期嫩莖的發生，另一方面也顧及石刁柏的同化作用，減少本省高溫的影響（養分蓄積較少），而且可以延長採收期間。

用這種方法，前段可以自二月中旬採收到六月中旬左右，後段在八月中旬到九月間可以繼續採收。所以，前後約有六個多月的採收期間，產量約高前者

驚奇的効力 · 害虫的剋星

西德最新出品低毒性安全強力殺虫劑

殺虫淨

乳劑 THIODAN® 35
日譯：チオダン

適用作物：稻、果樹、蔬菜、菸葉、棉花、豆類及地下害蟲。

特點：

- ※ 殺虫効力極強，對多種害虫具有奇効。
- ※ 對人畜無害，且無殘留毒。
- ※ 對蜜蜂及益虫無害，不致影響農作物之受粉並天敵之活動。
- ※ 對單獨使用「殺虫淨」就可防治各種害虫。
- ※ 殺虫効力極強，且無殘留毒。
- ※ 對人畜無害，且無殘留毒。
- ※ 對蜜蜂及益虫無害，不致影響農作物之受粉並天敵之活動。
- ※ 對單獨使用「殺虫淨」就可防治各種害虫。

製造元：西德赫司脫化工廠

養鴨 · 養豬 · 最好的飼料

日製強力ソリブル · 粗蛋白質60%

魚精

爲了……增加養鴨豬戶的收益。
而且……混合飼料的加工原料。
又屬……有機質肥料施於果樹蔬菜呈奇効。

※日本輸出元：東京通商株式會社

臺灣總經銷：一德貿易股份有限公司 臺北市南京西路五四號

電話：4 1 0 7 8 4 5 2 6 5

三分之一強。在本省，不受洪水氾濫的河川地帶和海岸地帶，都應該採用這種方法。

以上二種方法，各有一得一失，應按自己的環境，採用其中的一種。但在亞熱帶的本省，似以後者為佳。

十月以後，因為氣溫又適合石刁柏的同化作用，所以不應繼續採收嫩莖，讓嫩莖伸長，以謀莖葉形成，使它蓄積養分於貯藏根，提高次年嫩莖（白筍）的產量和品質。

十月以後雖然可以採收嫩莖，但應記住，養分貯藏量的多少，是由莖葉茂盛的程度，和同化期間的長短所決定的，在本省，在適合同化作用的氣溫下，應有七十天左右的莖葉茂盛期間，即十月至十二月中旬，這樣才可期待翠春有優良的嫩莖發生。

薑的留種貯藏和消毒

晉 姓

按一般農村習慣，薑必須過冬至後，才可作種薑之用，此說合乎學理嗎？據一般經驗，薑苗枯萎後，如留藏於原植地，常常發現薑內容變空，不知是什麼原因？又種薑消毒，應用何種藥品最妥？

薑的地上部呈淡綠色時，地下莖（薑）已十分充實，可作種薑，在本省普通十一月以後，薑地上部開始褪色，地下部隨着充實，十二月以後，薑株已經枯萎，過於成熟，往往引起腐敗，所以，請根據地上部情形判斷充實度。

農村習慣是經驗的累積，上面的說法是有根據的；因為過冬後所有的薑已十分充實，作為種薑毫無問題，收穫時，選擇沒有腐敗病的作為貯藏用，且應附目上，以利擦傷面木栓化，防止病菌侵入，預防在貯藏中引起乾腐。地上葉只需留三四分。

薑不耐低溫，如遇攝氏十度以下的溫度繼續幾天，就容易引起腐敗，所以，留在本圃越冬的種薑，在本圃受低溫影響，在地下開始腐爛，只遺留外皮。因此，種薑應採收貯藏於室內。貯藏時宜用馬斯普龍八百倍液浸漬十五分鐘後立即貯藏（不須再風乾）並在層上加入河砂或赤土，作為目土。

種薑的消毒，以水銀劑最好，例如「馬斯普龍」、「富米農」等，倍數用八百倍，浸漬十五分鐘就好。

龍鬚菜

為製造洋菜之原料，臺灣正在研究它的養殖方法。根據試殖

估計，一公頃面積全年約可收穫鮮菜三萬五千至四萬五千公斤，折算可曬乾菜五千二百五十至六千七百五十公斤。（中水）

!!藥用禽家品出 GLAND-O-LACCO 廠藥力競 國美



芬淨液

Funjol

為了防止細菌的傳播，消毒飲水，並由飲水殺滅體內的病菌，且可補給礦質養分，「芬淨液」是養雞必須的良劑。

說明書備索



那通粉

NARTON

含有開胃促進食慾的「那通粉」NARTON並配有抗生索、維他命，有機磷、礦質等，能促進食慾，刺激生長催增產卵，是一種保健及增產的良藥。



三蟲丸

TRIVERM

若用美國三蟲丸（TRIVERM），則一天內可以把最普遍的三種蠕蟲，從雞的肚裏除掉。多生一個蛋，多長幾兩肉就得賞還藥款。等您的家禽無寄生蟲了牠們會給您產生更多的蛋和肉。

號九三段一路東安長市北臺 廠物藥畜家際國 售均房藥大、行料飼地各