

効力保證100%的 優良農藥



亞洲化學股份有限公司出品

巴拉松47%乳劑
其他農藥全般



美國好速化學公司出品

安特靈 (エンドリン)
福爾丹 (ファルタン)



西德開地化學公司出品

巴拉多乳劑 (パラトール)



日本凡善藥品産業株式會社出品

可來得 (カーライト)



美國羅門哈斯公司出品

大生M-22

大生Z-78

開路生 (ケルヤン)



日本東亞農藥株式會社出品

水銀波爾多47.5%

(水銀ボルド)

地納胖 (ヂナポン)



美國賜德來植物油公司出品

蛋白質瓜果蠅引誘餌

(スターレ)



西德拜耳化學公司出品

米賜多愛

(メタシストックス・アイ)

多滿惠 (トマフイックス)

銅劑 50%

多穗 (ツーゼット)

農友們！ 請採用
最可靠的農藥吧！！

東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話43802·49663

建南農藥行

嘉義市中山路四五二號 電話2198

香菇的平地栽培

—砂塗陳—

(續完)

柱上橫放原木一根做為枕木，上面以天地向斜立原木數根；以下類推，原木間隙濕度高低而定。此法主用於平地或緩傾斜山坡地。

斜積式堆積法：先於兩根支柱間積木，上面以天地向斜立原木，過濕時可迅速乾燥。高度不得超出四英尺以上。

如以小刀拔開封蓋，可看到棉毛狀的白色菌絲，封蓋和木質成黃白色，有這些現象就表示菌絲已經發育。此時如仍按前法堆積，則容易發生雜菌，所以必須改變堆積法如下：井桁式堆積法：先在地下排上兩根原木，上面以相反方向再排四、五根，以上類推。原木間各保持相當距離，使下雨時雨水可淋到各層原木，過濕時可迅速乾燥。高

(四) 堆積

階段式堆積法：本法專用於傾斜的山地，先於兩根支柱上橫放原木一根，上面依傾斜的程度，用井桁法的原則去堆積。

在原木堆積期間，成隨時巡視堆積場，注意乾濕狀態，給於適當處理。管理定點有：①翻堆：每一至二個月應上下翻轉一次，使菌絲發育平均，並防止雜菌叢生，②清潔堆積場：堆積場所內的樹葉、草雜或小灌木，成時加清除。③除濕：梅雨期顯度過高，應致力通風工作，以阻遏雜菌蔓延。④酒水：平地非雨季時，應兩、三日酒水一次，以保持適當濕度。

(五) 產生

香菇菌絲的培養期間，與其他菇類為長，快者五個月，遲則需十個月，菌絲能完全蔓延。此時如溫度降至攝氏二十度，並給與濕氣，即能產生齊一。為管理方便起見，可利用池沼、河水或人工水泥將菇木放入浸水，時間約需一至二晝夜，起水後



平地栽培成功的香菇

以井桁堆積四、五天即開始產生，然後將菇木排成人字形，以利發育和採收。如果水量充足，可先排成人字形，再加酒水，每日三次，連續四天。香菇產生後，無需酒水可自行生長，如再酒水，香菇品質可能變劣。七、八開後即可採收，採收時用兩指抓住菌柄，先上下搖動，然後輕輕扭轉就可。採收後的香菇，可以鮮香菇出售，或利用陽光、火力乾燥後貯藏出售。