劑乙節，因本省尚未試驗，無法答覆。

生薑忌由中耕除草而斷根，引起生育欠佳。故尚未施用除草劑階段之現在，可由畦面蓋稻草，以抑制雜草之繁生，及土壤之固結。

二、若臺端對於除草劑有興趣，請向臺北市懷寧街一〇八號洪明輝先生詢問，並請他惠寄若干材料做試驗。（王進生）

## 茄子可於四—五月間播種



【問】：一、茄子在四～五月間，可否播種？二、最適株行距如何？（彰化縣溪洲鎮頂庄里崙仔腳路二十號陳新利）

【答】：一、在貴地（彰化）於四～五月間，均可播種育苗。

二、茄子之最適宜行株距爲行距〇・八公尺，株距〇・六公尺（王進生）

## 木耳段木上生雜菌　應注意改善通風



【問】我種有木耳若干，近來發現木耳上發有黃綠色海線樣雜物，及有小小蠅子，大如針樣大小，黃金色，還有大小蟲很多，請問：一、木耳上之黃綠色是何物？

二、有何方法及藥品可治？

三、木耳上有黃金色小蠅是何蟲，有何藥品可治？（彰化縣芳苑鄉文津村芳草路十九號洪政信）

【答】：一、木耳上之黃色物是褐藻。

二、改善通風，生黃色物之木耳拔去，如木材上有發生時，可用石灰水塗抹。

三、黃色小蠅，請附寄標本。（胡開仁）

## 卡滅克斯除草劑　不久即可運到本省



【問】：在貴刊見到一種叫做卡滅克斯的農藥，不知何處有賣？價格如何？禾本科雜草，是否也能滅殺？

【答】：①克卡滅斯是由臺北市合裕公司（中正路二一九九號）出售，但現在尚未運到臺灣，不久即可運到，請於本月月底直接寫信到該公司查問。

②據該公司說，此劑可以消除禾本科雜草。

## 柑園噴射有毒藥劑　不可放飼家禽



【問】：一、據說在高雄縣種植柑桔，可比嘉義縣早一個月出產。是否確實？

二、高雄縣種植橙類或椪柑，以何種最適合？

三、柑桔園常噴藥，是否可放飼土鷄。若不可，勉強放飼的管理，應如何做？（高雄縣路竹鄉甲南村二一號王元全）

【答】：一、高雄縣南端平地，栽培椪柑或印子柑，可比嘉義縣所栽者略早採收，但未必早至一個月。

二、高雄縣平地，因氣溫過高，種植甜橙及椪柑，均不甚適合，品質較差，故不宜大量種植，只能少量供應早市場。

三、柑桔園噴射有毒藥劑時，不可放飼家禽。如欲在柑桔園中放鷄，應先查明噴射藥劑之毒性，在噴藥後一定時間，等性減輕時，始可放出，有毒時間應將鷄關住。（陸之琳）


植物促進生育劑

效果確實

信用可靠

應供貨現

2571

總經銷：

信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號

各位農友兄弟　您愛農作物豐收嗎？
請用最新出品　高單位植物生長賀爾蒙劑




利農收是微量要素配合　高單位植物賀爾蒙劑
保證效果信用可靠　祝五穀豐收大賺錢
「種子價目表及使用說明書函索即寄」

總經銷　富農種苗行
高雄市中正四路180號
總經銷　利農種苗行
彰化縣彰化鎮中正路88號
全省各地農藥行、種子行、西藥行、均有售

各位農友您們想增加收入嗎？
請栽培優良種子保證滿意收穫!!

早生三十天青梗葉包心白菜子　白青皮メロン子
早生三十天黑葉包心白菜子　正晚生白骨白葉芹菜子
新夏秋三十五天包心白菜子　美國加州大粒甜椒子
新理想三十五天包心白菜子　双頭整齊大條刺瓜子
一代交配蕃茄子　黑仁青格菜豆子
日本福壽二號蕃茄子　黑仁黑格菜豆子
日本赤福三號蕃茄子　紅仁紅格櫞敏豆子
純正柿型蕃茄子　二尺半長紅仁白格菜豆子
優良蔬菜型蕃茄子　紅皮白露種黃瓜子
小粒種梨仔瓜子　青皮竹竿種黃瓜子
其他未列載種子在庫豐富備有目錄函索即寄各種包心白菜子，如需樣本請付郵資八角註明名稱及幾天種類以便奉贈。

新改良矮性白仁皇帝豆子
海湖西瓜子
春蒔五十天短種蘿蔔子
日本ニユーメロン子
清江大白菜子
交配長種胴脂茄子
益農素（強根、建樓、養實）
快豐收（高單位植物賀爾蒙劑）

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號（菜菜市場前）郵政劃撥儲中字二〇八四五號
分行：永靖鄉永興路六十一號（永靖農會證）