年老母猪應該淘汰



【問】：我家養的一頭母猪，已產過八次，最近兩次，均出生十三隻小猪，甚齊大，但在胎內死去十隻，生出的三隻隨即死亡，都是足月了才生的。

現在這頭母猪，又有一個月餘之胎，須如何預防上述的損失？

所用藥品何地可買呢？應飼何種飼料比較妥當？（嘉義縣大埔鄉大埔村一一三號陳峙）

【答】：據你所說，你的母猪兩次均爲死胎，這可能與配種的公猪有關係（遺傳上的關係）。現在這頭母豚懷孕已有一個月餘，在飼料方面應加些豆餅類，少許食鹽及骨粉，此外還要給些青飼料（如蕃薯葉，青菜葉等）。管理上，懷孕期中應給予輕度的運動。這頭母猪這胎產下後，似可淘汰了，因爲年齡大了，繁殖能力亦漸漸衰退，通常種母猪六歲後即予淘汰。（李登元）

飼鴨水質



【問】：鄙人開鑿一個地下水井，抽出的水，經半小時後，變成黃紅色。將該水送到糖廠化驗結果如下：

一、PH 7.20

二、酸化石灰　每公升千分之三八五公克（等於炭酸石灰千分之六八八公克，約多普通飲料水的五倍）

三、鹽化物多量

四、硫化物無

五、鐵和鋁少量

這個水飼養雛鴨有無防害？再至產卵時有影響嗎？請貴社詳細賜教是禱（臺南縣後壁鄉新東村村辦公處葉深潭）

【答】：據你所附水質化驗之結果，對於雛鴨飲用及餵與產卵鴨是不會有何影響的。（李登元）

柑桔落葉嚴重　對樹齡有影響

【問】：最近柑橘普遍大量落葉，不知何故。請示左列疑問：（平地柑園）

1 霜對柑橘樹（九年生）是否有害，大量落葉是否因降霜？

2 噴射夏油乳劑，及馬拉松，如果調合不當時，會不會引起落葉？

3 柑橘落葉，對樹的生命，及今年的開花有無影響？

4 防止落葉及補救有何有效方法？（彰化縣大村鄉大村國民學校賴呈鈞）

【答】：1 霜對柑桔樹，有若干不良影響，但大量落葉，恐非單因此次霜害所致，可能係過度乾旱加上霜凍二因子所造成。

2 馬拉松對柑桔葉無藥害，一致引起落葉，但夏油乾劑噴劑不當時，有引起落葉之可能。

3 柑桔落葉嚴重時，對樹齡有影響，對當年開花數無影響（因花芽早已形成）。但因葉已落光，新葉補充養分，一時恐有不及，故可能影響結實率及果實發育。

4 防治方法①乾旱季節多灌水，或在入乾旱季節之前，將果園覆草；②種植防風林，避免寒冷季節北風吹襲，③防霜④小心噴藥技術，⑤適當施肥。

目前補救之法①充分灌水，②充分施肥，③結果過多時，予於適當疏果。（劉富文）

讀者服務部小啓

傅柏榆　謝新炳　黃詢鑑　陳世南
官尹平　邱創琳　黃木松　林壽生
詹義雄　宋錦昌　黃金海　孫紹曾

以上各位農友的來信，已送專家答覆，請候本社回信。

早生三十天青粉葉包心白菜子
新夏秋三五天包心白菜子
特早理想夏四十天花椰菜子
交配種長身早菜頭子
頭州早六十天長身菜頭子
黑仁敏豆，白仁敏豆子
正晚生白葉白骨芹菜子
蘇魯種矮性木瓜子
大號究尾韭菜子
美國大五寸人參子（胡蘿蔔）
紅仁白格二尺半長菜豆子
日本ニーメロン子
新型梨仔瓜子
福特好242矮性皇帝豆子
80天油菜子
美國加州大粒甜椒子
日本新理想菠薐菜子（耐熱抗病力强早晚通用）
日本長岡一號甘藍菜子
日本長岡福壽二號トマト子
日本瀧野川牛蒡子
全年開花韭菜子
特選想思樹子
蘋果型トマト子
清紅白菜子
大號應菜子（空心菜）
尖葉小號應菜子（空心菜）
水上產青皮竹竿黃麻子
綠肥用太陽麻子
四四六青皮竹竿黃麻子
南洋田菁子

敝行尚有中藥內之紫蘇子生地種等歡迎照會，其他未刊載種子尚有歡迎照會，特效農藥東和牌噴霧器等歡迎光臨賜顧

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

在來種稻熱病

特效藥



特點：

一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）

二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）

三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告在發生病害區使用結果增收七%）

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用。

製造元日本三笠化學工業株式會社

總經銷　裕隆商行

臺中市建國路167號　TEL 4855

預防稻熱病、窒息病

請採用↓



奇特企業股份有限公司

全省各農會、農藥行、種子店均售