


！熱褥產猪母防謹



宣 欽 游

母猪因爲缺乏運動，猪舍不清潔，飼料配合不當等影響，使猪體衰弱或過肥，生產時都很容易引起難產而發生產褥熱。分娩時間超過四小時以上，可請獸醫注射配尼西林預防疾病。

發病現象

母猪分娩後三至四天突然發高熱，攝氏四十度以上，失去食慾，精神頹廢，橫臥不起，呼吸迫促，全身發抖，陰部流出不清潔的排泄物，就是產褥熱，主要是因爲平時運動不足，飼料配合不當，身體衰弱或母體過肥，在分娩時骨盤不易開闊，發生難產或延長分娩時間，胎兒在腹內不規則的轉動傷害產道，而由不潔猪舍中的病原菌侵入產道，引起發生產褥熱。

治療方法

母猪便秘可以用肥皂水二千西西灌腸，並灌服人工鹽一次六〇至八〇公分，注射配尼西

·話史葱洋灣臺·

- (一) 民國四十四年以前，臺灣洋蔥全部自日本輸入。
 - (二) 四十五年，臺灣洋蔥已能自給自足，停止進口。
 - (三) 四十七年起，臺灣洋蔥開始銷香港及越南等地區。
 - (四) 五十一年起，開始銷日本琉球。
 - (五) 今年外銷以日本爲主要對象。
- 據非正式估計，今年臺灣洋蔥外銷約有八十萬箱（每箱三十八斤）每箱以美金四元五角計，外匯收入可達三百六十萬美元。（宗雄）


林六〇至一二〇萬單位肌肉注射、或磺胺劑二〇至四〇西西的靜脈注射。
心臟衰弱，精神消沉時，注射強心劑（一〇〇安那加四至六西西）繼續注射至恢復爲止。
爲預防發生子宮內膜炎可施用水質配尼西林混合滅菌蒸溜水一千西西洗滌子宮。
陰部裂傷用配尼西林軟膏塗佈。
爲促進母猪食慾與提高泌乳量，須充分給予蛋白質和容易消化的飼料，使他回復正常才能使仔猪順利發育。

預防第一

- 一、在平時要讓母猪在平坦而清潔的運動場上充分活動，至分娩前兩三星期爲止。
 - 二、平常猪舍內外要保持清潔，尤其是分娩前後應用二〇〇來蘇液及D.T.殺滅細菌和蚊子蒼蠅，現時氣候漸趨溫熱，是細菌和蚊蟲繁殖最盛的時期，更須注意衛生，保持清潔，妥善飼養管理。
 - 三、母猪分娩時間約需二至三小時，若超過四小時以上者，注射配尼西林六〇萬單位以資預防發生產褥熱。
- 以上三點是請各位農友平時要注意母猪分娩前後的飼養管理來預防產褥熱，如果一旦母猪生產後有異常情形，應該立刻請獸醫診治。

節約儲蓄是好代
積少成多發大財

小宣
顧懷
圖文



知愛寵家大友農
該不大錢金費浪
(化)開亂錢樂玩飲吃
。來卜轉用要時到



(事好)代好是蓄儲約節
來家大元一日一
。財大發多成少積



財進李村東看請
愛思又旁勤妻夫
(掛解)佬呵龍尾頭厝
。才入的準標確的