



**接種雞痘疫苗時
拔除雞毛並無定數**

雙接種雞痘疫苗問題，在豐年十卷八期八頁、十一卷十一期十五頁、十一卷廿一期九頁、及十二卷十期十四頁等處，均有闡述。唯對接種部位，有主張



**家窩用具的
有效消毒方法**

【問】：養雞在不時管理上，消毒是件很重要的事。因為過去做的不徹底，而效果欠佳。特函請予指教。

一、對育雛器、雞籠、雞舍、食槽、水槽，如何消毒？用何種消毒劑最有效？及使用方法如何？

二、消毒劑之調配比例

三、各種消毒劑對人畜是否有影響？使用後之處理及其注意事項請予說明。（左營自勉新村四二四號魯毅）

【答】：對於育雛器具及其他家窩用具，通常有效之消毒方法，先用熱鹼水（一磅鹼對三〇加侖沸水調成液）洗刷乾淨。然後用百分之三—五之克里奧蘇 Creosol（其他燥焦油屬之消毒水均可）溶液噴洒消毒，經過消毒後，頂好在日光下晒兩小時後再應用之。

上述消毒方法，對人畜是無毒害的，不過管理者應用鹼水時，要避免手與溶液接觸，以免燙傷皮膚。（李登元）



來信請用明信片
寫真實姓名住址
信正面註「農問」
信中免寫客氣話



**利用雞的人工受精
可以調節孵化計劃**

【問】：我在貴刊上，讀到玉石鍾先生所寫「養雞也可應用人工授精」，及李詩宜先生經驗談「我實行養雞人工授精」大作之後，我也練習雞的人工授精。可是結果公雞沒有精液射出，試了幾次，都未成功，使我非常灰心，因此想向貴社請教

一、我所用的公雞是不是太老？

二、應用公、母雞之適期（起、止）如何？

三、對公、母雞有沒有影響？


四、自然交配和人工授精長短處比較如何？（臺北市泉州街三二之一林廷魁）

在外腹部者，有主張在大腿內側者。又對拔除羽毛數目，有主張拔除二、三十根者，亦有主張只拔去五至八根者。請問究以拔除多少根羽毛最為適當？接種部位又以大腿之內側還是外側適當？

二、初生小雞在其背部接種痘苗時，在背部接種之處應拔除多少根毛？或拔除多大面積的毛？（臺南市勝利路四九之四號楊徽青）

【答】：一、關於接種雞痘疫苗，拔除羽毛，並無一定之數目。但雞痘接種部位所需之面積甚少，拔除七、八根，使毛孔露出，易與病菌接觸即可。至於接種大腿之外側，則之效果，亦無分別，不過在大腿之外側，在工作比較方便而已。

二、如在背部接種不宜，因接種部位過於暴露，易引起傷害。（李登元）



紋 絕 (urbazid)

防治：紋枯病

γ BHC 1.5% 3% 粉劑

稻 熱 病 特 效 藥

- ◎ 稻熱病藥劑 [セレサノ石灰]
- ◎ 豐年錠 [H g 4.3%]
- ◎ 魔克利乳劑 [H g 5%]



興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五九號

臺北連絡處：
臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六