


，仍可能有毒素(氧酸)之存在。是有害豬體之健康的。

二、經過日光晒過，和米糠、鹽混合，可貯存三十四星期。

三、樹蔭粉頭營養極差，而且纖維素太高，飼養豬後不宜過多，每日給與量，不應超過其日糧五分之一。

枇杷種後應培養樹勢

五六年後始可讓結果



【問】：一、栽培茂木枇杷，最適合之土質是那一種？

二、種後幾年結果？

三、栽培行株距如何？

四、枇杷之施肥量及施肥期如何？

【答】：(廣東縣卑南鄉建和村魚池劉德明)

一、枇杷之栽培適地，為排水良好，土層深厚，不乾燥之輕鬆土壤。

二、初結果年齡為五、六年生。四年生以下幼株，應專培養種株樹勢，並整修樹形，不讓結果。

三、栽培距離三·六×三·六公尺，每公頃七五〇株。

四、三年生枇杷每株之施肥量如下：(單位公分)

- 大豆餅 三〇〇
- 過磷酸石灰 二五〇
- 硫酸鉀 五〇
- 堆肥 三、〇〇〇

五、施肥時期：

未結果株：十二月中旬施堆肥全量，大豆餅三分之一，過磷酸石灰三分之一，硫酸鉀三分之一。六月下旬、七月上旬殘量均施用。

結果株：開花後施用。

甜棗之修剪及施肥

【問】：甜棗之修剪及施肥量如何？

【答】：定植當時，即須於六〇、七〇

公分處，修剪樹幹頂部，固定三、五支主枝，以後須繼續修剪小枝。小枝過多時，枝條徒長不易結果。施肥量與枇杷相同。(翁仁祿)

夏油乳劑

可預防介壳蟲、粉虱等



【問】：一、鄙人種此柳橙，本應在每年收穫後噴霧夏油，但當收穫完時，已是萌芽開花之際，請問沒有噴夏油是否較不好呢？

二、有何藥劑可以代替夏油，且不影響母樹之芽、花、果，何時噴霧？

三、在收穫前是否可以噴波爾多液？何時須禁止(收穫前而果實已轉黃時，此準備明年幼果樹之保證而行的)？

四、目前有何藥劑對柑青野蟲較有效，而人畜的危險低的？(彰化縣永靖鄉五洋村五洋巷二號何村木)

【答】：一、若萌芽、開花前未噴射，在四、五月間亦可使用。

二、夏油乳劑可防治有蒸、裸體介殼蟲、粉虱及枝條上之地衣、石花等之發生。馬拉松可代夏油乳劑防治裸體介殼蟲、粉虱等為害，但對有殼介殼蟲類則無效力。枝條上之地衣及石灰，可塗佈石灰硫酸銅糊(十二：一)防治。

三、石灰波爾多液，在果實轉黃以前期間內，均可噴射，但在萌芽時，及小果時期噴射，效果較大。

四、青野蟲使用五馬拉松三、〇〇〇倍液，則可防治。有效期間四、五天。(翁仁祿)

讀者服務部小啓

詹德盛、張敏軒、王應鐘、程樹利、吳錫鏞、張立初、陳日新、孔祥隆、以上各位農友來信，已轉寄專家研究答覆，請候本社回信

預防稻熱病、室息病
請採用↓

植物生長賀爾蒙劑
一週豐

主成分
芳香族環狀
化合物片數種
100g

奇特企業股份有限公司

全省各農會、農藥行、種子店均售

在來種稻熱病特效藥

大好年2号
(DAIKO NEN)

三笠化学工業株式會社

特點：
一、絕無藥害(據50年度臺灣中區農業改良場試驗報告)
二、藥效優秀(據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
三、提高產量(據50年度臺灣中區農業改良場試驗報告)
在無發生病害區使用結果增收7%
注意：避免與安特靈等有機磷藥劑混合最好單獨使用。

製造元日本三笠化学工業株式會社
總經銷 裕隆商行
臺中市建國路167號 TEL 4855

農藥 的格合驗檢府政

能効証保 實確份成

牌東大 藥農牌東大用愛請敬

鳳豆茶西果蔬
梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病 稻水

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七七六四話電院七九段一路民三區市市中臺