


開路生防治紅蜘蛛四磅裝美國原裝



臺灣總代理青島貿易有限公司臺北市中正路一七五六號三樓說明書附郵八角即寄

熱天養豬 注意 日射病 熱射病

·宣欽游·



豬的皮下脂肪比其他動物特別厚，且汗腺機能不發達，所以體溫不容易發散。在炎熱的五到八月

，如果管理不週到，就會發生日射病或熱射病。

豬隻發生日射病或熱射病的原因，大部份因為豬舍屋頂太低或是由於蓋了鉛板使通風不良，又因豬舍裏不清潔，發生阿母尼亞氣體，豬感覺難受而且悶熱，容易引起熱射病。

其次，在太陽下放出運動的時間太久，或因陽光直射到豬舍裏的時間太長，也有的是因為炎熱中經過長距離的運輸，而沒有注意遮蔭澆水，都很容易發生日射病。

症狀

豬隻一經發病，突然呼吸迫促，體溫上昇到攝氏四十至四二度，結膜充血，瞳孔散大，口內乾燥，橫臥地面，祇要喝水而無食欲。

急性的，就使呼吸中樞麻痺，很快就死亡。症狀較重的，往往發生癲癇，精神不安，或急燥狀態。

普通性的，經過二至三日就漸漸恢復，但公豬發病後，容易引起睪丸炎，發生不能交配等現象。

治療

必須早期發現，緊急處理，把豬隻移到陰涼的地方，全身澆以冷水，另外用塊布或毛巾用水沾濕後放在胸部，使感涼爽，等到呼吸平順時，再用冷水灌腸幾次使體溫下降，並注射強心劑十%，安那加五公分至十公分樟腦注射液（ビタカンファ）二至四西西，並使病豬

保持安靜。

預防

本省氣候炎熱而夏季比較長，必須要使豬舍保持清潔涼爽，奉勸各位農友在建築豬舍和平時管理，必須考慮下列幾點：

(一) 建築豬舍：要冬季溫暖，夏季通風，牆壁離地面十五公分至四十公分，要留通風窗，尤其南北兩面更為重要，牆壁不要太高，大約七十五公分到九十公分就夠了。

(二) 避免太陽直射熱：屋頂離開地面要有適當的高度，廊下至少約二公尺以上，屋頂最好蓋稻草或鋪茅草後再蓋土瓦，豬舍周圍可以種植葡萄、菜瓜等蔓性作物，同時在運動場周圍也可以種植些夏季時樹葉比較繁茂的樹木，例如蓮霧、鳳凰木、桉樹等以遮蔽陽光為主。

(三) 夏季炎熱時應多撒水：每天上午十一時以後，豬舍溫度漸趨提高，因此豬舍裏面和豬身上每天要澆幾次水，最好使豬舍裏的溫度保持攝氏二十度以下，並且在運動場上另外設置水浴池，讓豬隻在夏天能自由進入，使牠身體涼快，增進健康。

(四) 購運豬隻：必須在上、下午比較涼爽的時候運輸，也要常常澆水。

訂正：本刊上期第十二頁第三節第四行：「二十%來蘇液」應改為：「二%來蘇液」。