

磚壁，損失就比較重。

(三) 倉庫地面用竹架等墊高的，因為通風良好，所以損失較輕，如果沒有用架的或則地面僅敷草席、穀殼等的損失並較嚴重。

(四) 最好能加防熱、防濕等設備，使甘藷不受外界氣候的影響，所以用南部常見的「鼓亭架」來貯藏甘藷較為理想。

(五) 在常用的倉庫和貯藏器具中，害蟲都會蛀入木料或竹料中間，等到新簽入倉以後再出來為害。所以無論倉庫和新舊器具，都要先行噴射二五DDT乳劑稀釋二十倍液，等乾燥後入倉。

(六) 甘藷簽曬乾後，立刻進倉的，因為熱氣高，損失重。如果曬乾後等冷卻了再進倉，損失較輕。

攪拌保滿丹

安全又可靠


據本文作者試驗結果，用「保滿丹」很均勻的拌入甘藷簽貯藏時，其損失率，可由十%減至二%。這樣一噸甘藷簽雖然貯藏五個月之後，仍可減少損失三百五十元。要注意的是，在工作時最好帶上口罩，防止吸入呼吸器官。

「保滿丹」(Bromodan)是有機氯化煙劑，純粹化合物是白色無味似水晶的粉劑，耐酸性強，但耐鹼性較弱，殺蟲效力，比「靈丹」「保粒寧」對人畜的毒性也低得多。且無累積性，極為安全。

例如以人的體重五十公斤計算，一次要吃五%「保滿丹」粉劑十二·九公斤(合二十一·五毫斤)，如果以拌藥的甘藷簽計算，要吃一萬九千三百五十公斤(合三萬二千二百五十毫斤)才到達五十%的致死量。經過拌藥以後的甘藷簽，又不會改變口味。實在是防治甘藷簽貯藏害蟲的一大特效藥劑。

計算藥劑使用量的方法，可以在甘藷簽在晒場已晒乾而未掃集以前，用目測估計，或根據生甘藷數量，折算諸簽量，比率是甘藷簽一千五百斤對五%「保滿丹」粉劑一斤。

使用時，先把甘藷簽用竹帚掃集成小堆或壘狀，厚約十至十五公分，然後把夾雜物除去，等冷卻後，用撒粉器或用手在無風時，把「保滿丹」藥粉均勻撒佈在甘藷簽上，再用箕箕裝入麻袋。連袋運到倉庫裏，再倒出來，在這一段工作過程中，可以使藥粉和甘藷簽很自然的充分攪拌，因為如果攪拌不均勻，效果就相差很遠。



正豐公司
又一新貢獻

大豐收肥素

是對植物生長上必須之最新
綜合微量要素肥料！

施用大豐收肥素能增加收量，補給微量要素之缺乏，改良土壤，促進植物生長，預防水稻室息病(黃萎病)及立枯病，並對落花落果落葉敗根等具有特效



(函索說明書即送)
正豐化學股份有限公司
台灣 霧峰

電話六三號



問世

