

水稻葉面施尿素

要注意適當濃度

【問】：第一期稻作利用尿素作葉面施肥，每壹公升水要放多少市兩的尿素？（桃園鎮新屋鄉平均村五十六之一號陳永源）

【答】：水稻葉面施用尿素的濃度，自〇·五至二·五，普通尿素含氮四六·六五，可加水四十至二十五倍，視水稻幼老而定，如水稻尚幼，應較稀薄，反之則可較濃厚，一公升水加二十五公分至四十公分尿素。

不要水稻倒伏

試種臺南一號

【問】：稻田兩邊是灌水溝，排水不良，每年種了水稻，到抽穗後，就全部倒伏，影響產量很大，請問：

一、有什麼蓬萊品種耐水性特強？最不易倒伏？產量又高？

二、肥料三要素的配合比例和施用量如何？（臺南縣安定鄉港口村四百一十號王忠雄）

【答】：一、稻田外邊是灌水溝，排水不良，似可在田內四周開溝，幫助排水。該田土質肥沃，可用較耐肥的稻種。請試種臺南一號或臺南三十八號品種。

二、三要素的比例中，硫酸可少施，甚至不做基肥，可視水稻生育情形再酌量施用。鉀肥及磷酸，則可酌量多施。（楊方平）

改良秧田床面稍高

竹林防風太高有害

【問】：何謂改良秧田？其方法如何？又秧田設於竹林旁邊有何利弊？對水稻產量關係如何？（宜蘭縣礁溪鄉大義村七十二號賴英照）

【答】：改良秧田即抱水秧田，畦寬（播床）一·二公尺，長度適中，播床面比田面高約五至六公分，以便調節灌水，秧田設於竹林邊，可以防風，但秧苗軟弱易徒長，若竹林高度不高，早晚約僅一小時遮陰，影響不大，如整天僅有五、六小時照到日光，就會影響水稻的生育，至於影響其產量的程度，尚未試驗，並無資料。（王進生）

杭菊六月定植

價格絕對穩固



【問】：一、現在想種菊花是否太晚？二、杭菊與朴菊是否相同？三、杭菊與朴菊加工後的時價各若干？

四、國際市場是否穩固？（臺東縣太麻里鄉華源村三鄰四十八號張太平）

【答】：一、杭菊扦插適期為五月，六月定植。尤其今年農曆閏四月季節較慢。現種並不晚，十一月採收。以上月份均指新曆。

二、杭菊花分兩種，一種叫白菊，一種叫黃甘菊。至於其他的朴菊、白菊、繡菊、黃菊等都是藥用菊花，效果差不多，但銷路不穩。

三、杭菊的零售價格經詢臺北某茶行，香港進口貨每兩三十元。本省產品一兩十五元，某出口商向栽培者收購價格每斤八十元，假杭菊（俗稱白菊）每壹斤二十元，且

農藥字第209號
登記合格
農林廳農藥

驚奇的効力·害虫的剋星

西德最新出品低毒性安全強力殺虫劑

殺虫淨

乳劑 THIODAN® 35
日譯：チオダン

適用作物：稻、果樹、蔬菜、菸葉、棉花、豆類及地下害蟲。

特點：※殺害蟲種類廣闊，在西德已證明對200種以上之害蟲具有奇効。
※對人畜毒性低，而且無積毒性，因此可安心使用。
※效能保持三星期以上，可節省藥費及工資。
※對蜜蜂及很多益蟲無害，因此不致影響農作物之受粉並天敵之活動。
※對單獨使用「殺虫淨」就可防治各種併發害蟲。
※除了除性藥劑外均可混合使用。

製造元：西德赫司脫化工廠

養鴨。養豬。最好的飼料

日製強力ソリブル・粗蛋白質60%

魚精

爲了……增加養鴨豬戶的收益。
而且……混合飼料的加工原料。
又屬……有機質肥料施於果樹蔬菜呈奇効。

※日本輸出元：東京通商株式會社

臺灣總經銷：一德貿易股份有限公司 臺北市南京西路五四號

電話：41078 45265

無人收購但要注意以上都是指加工後的時價。

大豆新品種

屏東正推廣

【問】一、臺大高雄一號與二號大豆新品種已推廣嗎？向何處洽購？



二、那品種是否適於水田第二期收穫後播種？用撒播還是條播？可在水稻行間條播嗎？（屏東縣新埤鄉新埤村新華路八號曾國源）

【答】一、臺大高雄一號二號與五號已經推廣，屏東縣里港、九如、萬丹、內埔等鄉已大量繁殖種子，如需購買，高雄區農業改良場可以代為介紹。

二、以上三品種均適於秋作（冬季裡作），但以五號為最佳，第二期水稻收穫後，於行間用小鐵耙挖淺穴點播，或將禾根翻轉點播，都是省工省時的新方法。（劉文慶）

柑桔落果原因多

開花期不噴藥劑

【問】：我栽柑桔晚旬及伍伍株請問：一、柑桔開花期可以噴農藥嗎？二、結實後，約指大的果實，有落果的現象，是何原因？有何方法防止？開花受粉後可立即噴藥嗎？

三、結果後也可以噴夏油嗎？

四、結果後施追肥對於果實會較大嗎？每株四年生應施多少肥？

五、果皮不會變黃色，而稍有黑斑，什麼原因？如何防治？（臺東縣卑南鄉美濃村萬萬廿六號游見賢）

【答】：一、柑桔開花期最好不要噴施任何農藥。

二、柑桔落果的原因很多，例如地太乾太濕或霜雪風害等（柑桔本身的生理關係或施肥不當，如在開花期施藥，或


開花至結小果時，如地下水位太高而施用夏油或夏油濃度過濃等。）缺乏肥料。（病蟲害等）原因都會引起落果，應注意管理。

三、結果後如要噴夏油，應在果實有拇指大後噴射較宜。

四、結果後仍要施肥，大約一年施三次較佳，即一月間，四、五月間，七、八月間，四年生柑桔每株全年三次施肥量共需氮二百公分，磷七十公分，鉀一百三十公分。

五、果皮不黃，可在近成熟期即採收前二、三個月裡多噴幾次石灰硫黃合劑，可促進果色，果皮有黑斑，有的是蟲或病害，有的是藥害，故應注意防治病蟲害，並確實按照政府規定的藥劑使用濃度施用。（張長德）

梨樹葡萄有病可噴波爾多液



【問】：一、我所種梨樹，每年在四、五月間，樹葉柄發生黑斑點而乾枯，是何病害？如何防治？

二、一、二年生葡萄，在心葉發生黑斑點直至乾枯，是何病害？如何防治？（桃園縣觀音鄉樹林村一號吳昌富）

【答】：一、來信所指梨樹葉所害的病是受黑星病菌所侵。防治法：（一）迅速去病枝葉集中燒燬。（二）在四至五月間，撒佈三六式石灰波爾多液，另在包住花芽的鱗苞即將落時，花蕾出現時，及開花初期，分別撒佈三六式或四八式石灰波爾多液，嗣後果實約長成豆粒大小時及掛袋前後，每隔十天定期撒佈兩次，在九至十月間，再撒佈二至三次。

二、一、二年生葡萄心葉所生黑斑點，是受黑痘病菌所侵。防治法：（一）發芽後新梢長約十公分時，開始至開花前每隔一星期撒佈三一·一五式石灰波爾多液一次，花落之後，撒佈三一·一五式或六三式石灰波爾多液二、三次。（二）剪定時剪除病枝，集中燒燬。（吳福壽）

植物促進生育劑

效果確實

信用可靠

應供貨現

2571

總經理：

信承農產行

溪湖鎮平和里鹿路66號
電話 261號

欲想發財增加你的收入請栽培高貴中藥及優良種子保證滿意收穫

一、生地黄（高貴中藥正四川種苗）
二、甲生三十天黑包心白藥子
三、早生三十天黑包心白藥子
四、新理想三五天包心白藥子
五、新理想三五天包心白藥子
六、新理想三五天包心白藥子
七、新理想三五天包心白藥子
八、新理想三五天包心白藥子
九、新理想三五天包心白藥子
十、新理想三五天包心白藥子
十一、新理想三五天包心白藥子
十二、新理想三五天包心白藥子
十三、新理想三五天包心白藥子
十四、新理想三五天包心白藥子
十五、新理想三五天包心白藥子
十六、新理想三五天包心白藥子
十七、新理想三五天包心白藥子
十八、新理想三五天包心白藥子
十九、新理想三五天包心白藥子
二十、新理想三五天包心白藥子
二十一、新理想三五天包心白藥子
二十二、新理想三五天包心白藥子
二十三、新理想三五天包心白藥子
二十四、新理想三五天包心白藥子
二十五、新理想三五天包心白藥子
二十六、新理想三五天包心白藥子
二十七、新理想三五天包心白藥子
二十八、新理想三五天包心白藥子
二十九、新理想三五天包心白藥子
三十、新理想三五天包心白藥子
三十一、新理想三五天包心白藥子
三十二、新理想三五天包心白藥子
三十三、新理想三五天包心白藥子
三十四、新理想三五天包心白藥子
三十五、新理想三五天包心白藥子
三十六、新理想三五天包心白藥子
三十七、新理想三五天包心白藥子
三十八、新理想三五天包心白藥子
三十九、新理想三五天包心白藥子
四十、新理想三五天包心白藥子
四十一、新理想三五天包心白藥子
四十二、新理想三五天包心白藥子
四十三、新理想三五天包心白藥子
四十四、新理想三五天包心白藥子
四十五、新理想三五天包心白藥子
四十六、新理想三五天包心白藥子
四十七、新理想三五天包心白藥子
四十八、新理想三五天包心白藥子
四十九、新理想三五天包心白藥子
五十、新理想三五天包心白藥子
五十一、新理想三五天包心白藥子
五十二、新理想三五天包心白藥子
五十三、新理想三五天包心白藥子
五十四、新理想三五天包心白藥子
五十五、新理想三五天包心白藥子
五十六、新理想三五天包心白藥子
五十七、新理想三五天包心白藥子
五十八、新理想三五天包心白藥子
五十九、新理想三五天包心白藥子
六十、新理想三五天包心白藥子
六十一、新理想三五天包心白藥子
六十二、新理想三五天包心白藥子
六十三、新理想三五天包心白藥子
六十四、新理想三五天包心白藥子
六十五、新理想三五天包心白藥子
六十六、新理想三五天包心白藥子
六十七、新理想三五天包心白藥子
六十八、新理想三五天包心白藥子
六十九、新理想三五天包心白藥子
七十、新理想三五天包心白藥子
七十一、新理想三五天包心白藥子
七十二、新理想三五天包心白藥子
七十三、新理想三五天包心白藥子
七十四、新理想三五天包心白藥子
七十五、新理想三五天包心白藥子
七十六、新理想三五天包心白藥子
七十七、新理想三五天包心白藥子
七十八、新理想三五天包心白藥子
七十九、新理想三五天包心白藥子
八十、新理想三五天包心白藥子
八十一、新理想三五天包心白藥子
八十二、新理想三五天包心白藥子
八十三、新理想三五天包心白藥子
八十四、新理想三五天包心白藥子
八十五、新理想三五天包心白藥子
八十六、新理想三五天包心白藥子
八十七、新理想三五天包心白藥子
八十八、新理想三五天包心白藥子
八十九、新理想三五天包心白藥子
九十、新理想三五天包心白藥子
九十一、新理想三五天包心白藥子
九十二、新理想三五天包心白藥子
九十三、新理想三五天包心白藥子
九十四、新理想三五天包心白藥子
九十五、新理想三五天包心白藥子
九十六、新理想三五天包心白藥子
九十七、新理想三五天包心白藥子
九十八、新理想三五天包心白藥子
九十九、新理想三五天包心白藥子
一百、新理想三五天包心白藥子

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號（菜菜市場前）
分行：永靖鄉永興路六十一號（永靖農會邊）
郵政劃撥儲蓄中二〇八四五號


各位農友兄弟 您愛農作物豐收嗎？
請用最新出品 高單位植物生長賀爾蒙劑



利農收是微量要素配合 高單位植物賀爾蒙劑
保證效果信用可靠 祝五穀豐收大賺錢
「種子價目表及使用說明書函索即寄」

總經銷 富農種苗行
高雄市中正四路180號
總經銷 利農種苗行
彰化縣員林鎮中正路88號
全省各地農藥行、種子行、
西藥行、均有售

地下害蟲猖獗 用阿特靈預防



甘藷，病害特別嚴重，如何防治？（雲林縣西螺鎮鹿場里八十七號謝富吉）

【答】：一、二、三各問地下害蟲的防治法是用四十多「阿特靈」可濕性粉每分地一臺斤溶於二百倍水中，平均撒在地面後，耕犁翻拌入土中。然後再種植作物。（參考本刊第十卷第十一期第六頁）如種甘藷可避免象鼻蟲、甘藷猿葉蟲、金龜子幼蟲（鷄母蟲）等地下蟲為害，尤其在連作甘藷地，效力更顯著。其他甘藷害蟲如：螟蟲、各種夜盜蟲、蝦蟇天蛾、鳥羽蛾、小蛾、捲葉蟲、飾翅蛾等在甘藷苗插植前用二十五%D D T乳劑一百倍液浸漬二分鐘後取出種植。（注意甘藷苗要新鮮的，否則會引起藥害）並在各種害蟲初發生時，用同一藥加水四百倍液防治就可以。

倉庫害蟲猖獗 預防方法簡單



【問】：我們農家每年在第一期水稻收穫後，在穀倉裏怎麼會發生蟲害？是否晒得乾乾？還是不够乾？（彰化縣大村鄉茄荖村六十一號賴秋都）

【答】：穀物在倉庫中發生蟲害，是由於積穀害蟲為害，其防治法如下：
一、穀物入倉前，空倉用二十五%D D T乳劑十五至二十倍稀釋液噴射，殺死留在倉庫裏的害蟲。
二、穀物入倉時，用〇・二%「靈丹」浸淨粉劑一比八百或百分之五「保滿丹」浸淨粉劑一比一千五百（藥粉一斤對穀物一千五百斤）和乾穀均勻拌和後再入倉。

三、如作種用的稻麥及豆類種子，用〇・二%「靈丹」浸淨粉劑一比三百至五百（藥粉一斤對穀物三百至五百斤）均勻拌和後貯藏。（張良傳）

大蟋蟀猖獗 用毒餌防治

【問】：本人最近所種部份胡瓜及豇豆等，經常遭大蟋蟀（土猴）咬斷，雖曾用飛佈粉堵塞洞口，但無效果，如用水灌注，又因土壤鬆而易塌，請問有何方法可以防治？（中壢鎮後寮里四二之一號李金廷）

【答】：防治大蟋蟀（土猴）可在午後將大蟋蟀孔穴上的土，用小鋤頭或鏟子鏟除，以便先找到孔穴，而後用生甘藷藥或甘藷藥柄切碎的藥葉（大蟋蟀喜歡的食物都可以）加少許花生油攪拌，再加拌一・五至三% B H C 粉或阿特靈粉或飛佈粉，然後塞進孔穴裏，大蟋蟀在夜晚出來取食，因而中毒致死。（張良傳）



室內除蚊子 D D T 最好

【問】：殺除室內蚊蟲，以何種藥液最好？又最安全？（桃園縣新屋鄉平均五十六號之一陳永源）

【答】：以二十五%D D T 乳劑較安全經濟。加水四倍噴射，關閉門窗，人外出二十分鐘就可殺死全部室內蚊蟲。

蔬菜有紅蜘蛛 可噴射開路生


【問】：蔬菜（空心菜）被紅蜘蛛為害如何防治？（永和鎮仁愛街六十三巷二弄六號孫連生）

【答】：紅蜘蛛為害蔬菜，應噴射開路生二〇%可濕性粉劑（不可用乳劑，以免發生藥害）四百倍液一次，如無此藥，可用馬拉松五百倍液，每隔一週一次共兩次。（張良傳）

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號

藥農


的格合驗檢府政



能効証保 實確份成

牌東大

藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果藤
梨類葉瓜樹茶

藥効特，害虫，害病

稻水

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七七七六四第電號七九一一路民三區市市臺中

