


地下害蟲猖獗 用阿特靈預防



甘諸，病害特別嚴重，如何防治？（雲林縣西螺鎮鹿場里八十七號謝富吉）

【答】：一、二、三各間地下害蟲的防治法是用四十多「阿特靈」可濕性粉每分地一臺斤溶於二百倍水中，平均撒在地面後，耕犁翻拌入土中。然後再種植作物。（參考本刊第十卷第十一期第六頁）如種甘諸可避免象鼻蟲、甘諸猿葉蟲、金龜子幼蟲（鷄母蟲）等地下蟲為害，尤其在連作甘諸地，效力更顯著。其他甘諸害蟲如：螟蟲、各種夜盜蟲、蝦蟇天蛾、鳥羽蛾、小蛾、捲葉蟲、飾翅蛾等在甘諸苗插植前用二十五% DDT乳劑一百倍液浸漬二分鐘後取出種植。（注意甘諸苗要新鮮的，否則會引起藥害）並在各種害蟲初發生時，用同一藥加水四百倍液防治就可以。

倉庫害蟲猖獗 預防方法簡單



【問】：我們農家每年在第一期水稻收穫後，在穀倉裏怎麼會發生蟲害？是否晒得乾乾？還是不够乾？（彰化縣大村鄉茄荖村六十一號賴秋都）

【答】：穀物在倉庫中發生蟲害，是由於積穀害蟲為害，其防治法如下：
一、穀物入倉前，空倉用二十五% DDT乳劑十五至二十倍稀釋液噴射，殺死留在倉庫裏的害蟲。
二、穀物入倉時，用〇.二%「靈丹」浸淨粉劑一比八百或百分之五「保滿丹」浸淨粉劑一比一千五百（藥粉一斤對穀物一千五百斤）和乾穀均勻拌和後再入倉。

三、如作種用的稻麥及豆類種子，用〇.二%「靈丹」浸淨粉劑一比三百至五百（藥粉一斤對穀物三百至五百斤）均勻拌和後貯藏。（張良傳）

大蟋蟀猖獗 用毒餌防治

【問】：本人最近所種部份胡瓜及豇豆等，經常遭大蟋蟀（土猴）咬斷，雖曾用飛佈粉堵塞洞口，但無效果，如用水灌注，又因土壤鬆而易塌，請問有何方法可以防治？（中壢鎮後寮里四二之一號李金廷）

【答】：防治大蟋蟀（土猴）可在午後將大蟋蟀孔穴上的土，用小鋤頭或鏟子鏟除，以便先找到孔穴，而後用生甘諸葉或甘諸葉柄切碎的藥葉（大蟋蟀喜歡的食物都可以）加少許花生油攪拌，再加拌一.五至三% BHC粉或阿特靈粉或飛佈粉，然後塞進孔穴裏，大蟋蟀在夜晚出來取食，因而中毒致死。（張良傳）



室內除蚊子 DDT最好

【問】：殺除室內蚊蟲，以何種藥液最好？又最安全？（桃園縣新屋鄉平均五十六號之一陳永源）

【答】：以二十五% DDT乳劑較安全經濟。加水四倍噴射，關閉門窗，人外出二十分鐘就可殺死全部室內蚊蟲。

蔬菜有紅蜘蛛 可噴射開路生


【問】：蔬菜（空心菜）被紅蜘蛛為害如何防治？（永和鎮仁愛街六十三巷二弄六號孫連生）

【答】：紅蜘蛛為害蔬菜，應噴射開路生二%可濕性粉劑（不可用乳劑，以免發生藥害）四百倍液一次，如無此藥，可用馬拉松五百倍液，每隔一週一次共兩次。（張良傳）

養鴨新藥

安全可靠

效力高強



預防治療劑

安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。

絕無其他副作用（保證沒落蛋）

• 全省到處均有出售 •



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號

藥農

的格合驗檢府政



能効証保 實確份成

牌東大

藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果藤
梨類葉瓜樹茶

藥効特，害虫，害病

稻水

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七十七四路電號七九設一路民三區市市中臺