

他怎樣栽培無子西瓜

逸

顏允農友，住在雲林縣二崙鄉大庄村新興路五十四號，是本年度西螺地區，栽植無子西瓜最多最成功的一位。他種的鳳山一號和五號的兩個品種，一共四千株，淨賺了六萬元。

記者訪問顏農友時，他首先說明無子西瓜種子的外殼和臍丘部都特別的肥厚，不容易吸收水分。所以在播種前，可用門牙輕輕咬開臍丘部，或用小刀把種子的臍丘部切去，使容易吸收水和萌芽。

雲林一帶最適宜的播種期是二、三月，那時候氣溫還低，要在攝氏二十四至二十九度的定溫箱裏催芽。也有將種子放在餅干盒中，盒上鑽孔，給以適宜的水分，包在棉被裏，以人體體溫使萌芽的，效果也還好。

待幼芽透出種殼約一公分長，就可以取出，播種在塑膠袋內育苗。冬季氣溫較低，如果把剛發芽的種子，直接在本田育苗，勢必凍死。因此，特別用潤約二十公分，長約十八公分的透明塑膠袋五千個，剪去袋底，便於排水，袋裏裝入砂質壤土，加一半腐熟細碎的堆肥；種下經過催好芽的種子，放在朝南避風的房子前面。週圍用塑膠布和竹片，做成弧形的罩，覆蓋在上面，可以防風和保溫。

平時經常注意通風，夜間須全部覆蓋。每隔五至六天，噴射馬拉松加大生藥液一次，防除蟲害。在塑膠袋內培養了約三十多天，當真葉長到三至四枚時，就可移到本圃栽植。

顏農友約用一·八公頃土地，種了四千株，因為無子西瓜的雄花，屬於不孕性，必須間隔混種一千株普通西瓜，以為無子西瓜採粉之用。顏農友所種鳳山一號是用「蜜寶」種混植，鳳山五號用「富光」種混植。

無子西瓜的生長期，約為四個月。據顏農友估計，每株西瓜在生長過程中，約須二十擔水，



所以，灌水是栽植期間，最辛苦的工作。顏農友的一·八公頃土地，用了堆肥十五萬公斤，硫酸銨二百公斤，可能是氮肥用量太多了，以致瓜葉徒長影響結果。通常在主蔓上第一朵花所結的西瓜，大都是畸形果或厚皮果，並且時常有黑色的種子出現，影響品質，必須摘除。但是側蔓上的第一雌花，可不必摘除，等到主蔓上第二雌花出現，約在第十六節以後，才可開始授粉留果，最理想是一蔓祇留一果。

外銷香港的無子西瓜，產地交貨，每公斤二十三元。但規格很嚴，每瓜以五公斤重為標準，過大過小都不合格。顏農友因為種植太密，留果時，照顧不過，以致約有十分之二為畸形果，十分之一為厚皮果。他雖然種了四千株，每株平均祇得了二個瓜，每個以五公斤計算，約可得七萬元；扣除種子（每粒三角）、肥料和農藥等成本一萬元外，淨賺六萬元。

大生二十二殺菌劑
DITH NE M-22

開路生紅蜘蛛殺除劑
KELTHANE W

大生七十八殺菌劑
DITHANE Z-78

出來通—114展着劑
TRITON X-114

可利生白粉病特效劑
KARATHANE WD

出來通—1956展着劑
TRITON B-1956

尚有他種農藥•函索說明書附郵票八角即寄



臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路 1756 號三樓 電話：36177