



**雞群新城市**

**要預防注射**



【問】：我飼養雞十幾隻，四月中旬發現下白痢，繼變綠色，很急，飲水多，在三小時內病勢急劇變壞，頭頸下垂地，宰掉了，隔了一天又有一隻病況如前，宰後發現盲腸腫大，但生前並無異狀，請問何病？如何防治？（臺南市勝利路四九之四號楊徵青）

【答】：前述情形，可能是患家禽新城病。新城病急性的，死得很快，並無任何病狀。目前並無特效藥物可供治療，只有在事前，即健康時施行新城病疫苗預防注射。病雞應予撲殺掩埋，雞舍用具，應行嚴格消毒。防以後再行傳染。

**尿素葉面施肥**

**濃度各有不同**

【問】：使用尿素作葉面施肥，對於蔬菜番茄和紅甘蔗的稀釋倍數各如何？（花蓮縣吉安鄉香村廣賢路十一號曾振都）

【答】：一、蔬菜番

茄撒佈尿素普通濃度是千分之五，葉面較老澆的可較濃，最多不超過百分之一。  
二、紅甘蔗撒佈尿素可用百分之一。  
五至二·五，視生長期間可變異。（臺灣肥料股份有限公司推廣處）

**青枯病不是立枯病**

**豬糞尿可以作堆肥**

【問】：一、番茄青枯病和立枯病是否相同？  
二、豬糞尿可代替堆肥嗎？  
三、豬糞尿可作追肥嗎？  
四、豬糞尿之中是否有青枯菌？  
五、番茄自播種至定植約需幾天？（臺北縣三峽鎮弘道里一二二號鄭福興）

【答】：一、青枯病病原菌是細菌，立枯病病原菌是擔子菌，兩者完全不同。（番茄品種 Early Pink (アーリピンク) 及新豐玉較抗青枯病。  
二、豬糞尿可代替堆肥，但所含成分的百分率不同，應斟酌其使用量。  
三、腐熟豬糞尿適合作追肥。  
四、經過醱酵腐熟的豬糞尿並無青枯病菌。  
五、番茄自播種至定植（本葉十枚左右）在溫度攝氏二五度約需三十天。在攝氏二十度以上，約需四十五至五十天（王進生）

**乾製洋菇並無銷路**



**十號林欽記**

【問】：報載洋菇曬乾加工，已經研究成功了，請問：（一）今年度是否仍有此類加工工廠？（二）加工後有何用途？（臺中縣龍井鄉山脚村西巷三十號林欽記）

【答】：洋菇加工，適宜製罐，不宜乾製。因為本省洋菇栽培面積太多，洋菇工廠不能全部製成罐頭，所以考慮加工乾製。但是因為乾製洋菇品質不好，並無銷路，所以過去工廠僅是做洋菇乾製試驗而並無正式收購。

# 巴拉松乳劑

# 美拉松乳劑

農藥登記字第 225 號

農藥登記字第 006 號

特效藥 二化螟 虫 特 効 藥

毒性：巴拉松之 1/5

浸透性：巴拉松之 三倍強

莫馬 P 灵 綠 可 可	思拉 宝 美 美	脫松 M 丹 銅 農 農	殺乳 乳 粉 乳 水	鼠 劑 劑 劑 劑 劑 劑 劑 劑	劑 劑 劑 劑 劑 劑 劑 劑

（農藥登記字第 039 號）

（農藥登記字第 56 號）

（農藥登記字第 122 號）

（農藥登記字第 045 號）

（農藥登記字第 200 號）

稻熱病特效藥

正豐化學股份有限公司出品

台灣 霧峯 電話·六三號