三、栽培時應注意些什麼？（嘉義縣朴子鎮大蕉里一二三號徐朝松）

【答】：一、朴子地區棚仔栽培珠豆（白大豆）毫無問題，臺中區農業改良場有大豆棚仔栽培手冊，請索贈一份作爲參考。

二、種子請向臺中區農業改良場余農藝課長介紹爲宜。

三、手冊裏對於適宜的品種和灌水等管理方法都有詳細記載。（王進生）

毛豆敏豆不相同
不可使用安特靈



【問】：一、毛豆和矮性四季豆有何差別？

二、種子何處出售？

三、除在第一期水稻收穫後種植外，有無更詳細的播種方法？（花蓮縣玉里鎮三民里南區三四號葉漢東）

【答】：一、大豆尚未成熟前，連枝採收，當作蔬菜出售的叫作毛豆，也稱枝豆（日名エダマメ），矮性四季豆是矮性菜豆，又稱敏豆，兩者雖屬豆類但完全不同。

二、兩者種子，到處有售。

三、毛豆的栽培法和普通大豆栽培法相同，但因毛豆是在未成熟之前就採收的，絕對不可以噴射安特靈，應噴射馬拉松，才不致害人。臺北區農業改良場有「矮性菜豆」栽培手冊備函索。（王進生）

屏東二期作
不宜種紅花

【問】：一、請問在南部地區二期水稻收穫後想種紅花，如果到採子完了，會影響第一期水稻插秧嗎？

二、自播種到採子要幾天？

三、種子可能供應嗎？（屏東縣萬丹鄉灣內村十一號王保連）

【答】：一、紅花的開花期受日照長短影響很大，由長而短或由短而長的過程中都會開花，屏東地區插秧若在一、二月間，則絕對會受影響，因爲紅花開花期約在二、三月間。

二、最長五個月，最短一個月，比如說在二、三月開花者，在十至一月各月份播種的，到了二、三月都會開花，所以不能一概而論。

三、紅花宜於甘蔗園的間作，即種植甘蔗的初期可播紅花，互不影響，惟須多注意施肥。

四、將來農復會如有計劃推廣時，種子將免費供應。

馬鈴薯遇收會發芽
收獲後自然會休眠

【問】：一、本人所植馬鈴薯今已收成，但在土中就開始萌芽了，長度約有二公分，是何原因？現在如何能使它休眠，始能在十月間種植。

二、選種是大的好還是小的也可以？（楊梅鎮瑞塘里十六鄰廿二號黃東仙）

【答】：在春季種植的馬鈴薯，如在五月上旬未收穫，即在塊莖（薯）上萌芽。又如覆土不足時，其長芽程度較高。原因是溫度過高消耗過多的緣故。雖有芽，但收穫後自然會入休眠狀態。

二、種薯應選大粒的，小粒的易混毒素病薯。（郭國柱）

胡錦鳥每對七百元
繳費可入飼鳥協會

【問】一、胡錦鳥何處有賣？價格約需多少？

二、如何加入飼鳥協會，手續如何？（雲林縣褒忠鄉六塊厝三號張榮參）

【答】：一、洋鳥類主要生產地是新竹市和苗栗鎮公館鄉，胡錦鳥目前市價，成鳥每對七百元，雛鳥每對三五〇元。

二、填一份入會申請書，一寸半身相片二張，常年會費六十元分上下半年繳納，入會費十五元。（臺灣省飼鳥協會推廣委員會邱見堂）

金門種櫻桃蘿蔔
辣味較弱味甜嫩

【問】：上月中旬本人使用堆肥及少量硫銨作基肥，栽培櫻桃蘿蔔，發芽後十五天



