

三、栽培時應注意些什麼？（嘉義縣朴
鎮大萬里一二三號徐朝松）

【答】：一、朴子地區桐仔栽培珠豆（
白大豆）毫無問題，臺中區農業改良場有大
豆桐仔栽培手冊，請索贈一份作為參考。

二、種子請向臺中區農業改良場余農藝
課長介紹為宜。

三、手冊對於適宜的品種和灌水等管
理方法都有詳細記載。（王進生）

毛豆敏豆不相同

不可使用安特靈

【問】：一、毛豆和矮性
四季豆有何差別？

二、種子何處出售？

三、除在第一期水稻收穫

後種植外，有無更詳細的播種方法？（花蓮
縣玉里鎮三民里南區三四號葉漢東）

【答】：一、大豆尚未成熟前，連枝採收
，當作蔬菜出售的叫作毛豆，也稱枝豆（日
名エタマメ），矮性四季豆是矮性菜豆，又
稱敏豆，兩者雖屬豆類但完全不同。

二、兩者種子，到處有售。

三、毛豆的栽培法和普通大豆栽培法相
同，但因毛豆是在未成熟之前就採收的，絕
對不可以噴射安特靈，應噴射馬拉松，才不
致害人。臺北區農業改良場有「矮性菜豆」
栽培手冊備函索。（王進生）

屏東二期作

不宜種紅花

【問】：一、請問在南部地區二期水稻
收穫後想種紅花，如果到採子完了，會影響
第一期水稻插秧嗎？

二、自播種到採子要幾天？

三、種子可能供應嗎？（屏東縣萬丹鄉
灣內村十一號王保連）

【答】：一、紅花的開花期受日照長短
影響很大，由長而短或由短而長的過程中都
會開花，屏東地區插秧若在一、二月間，則
絕對會受影響，因為紅花開花期約在二、三
月間。

二、最長五個月，最短一個月，比如說

在二、三月開花者，在十至一月各月份播種
的，到了二、三月都會開花，所以不能一概
而論。

三、紅花宜於甘蔗園的間作，即種植甘
蔗的初期可播紅花，互不影響，惟須多注意
施肥。

四、將來農復會如有計劃推廣時，種子
將免費供應。

馬鈴薯遲收會發芽

收穫後自然會休眠

【問】：一、本人所植馬鈴薯今已收成
，但在土中就開始萌芽了，長度約有二公分
，是什么原因？現在如何能使它休眠，始能在
十月間種植。

二、選擇是大的好還是小的也可以？（
楊梅鎮瑞里十六鄰廿二號黃東仙）

【答】：一、在春季種植的馬鈴薯，如在五
月上旬未收穫，即在塊莖（薯）上萌芽。又
如覆土不足時，其長芽程度較高。原因是溫
度過高消耗過多的緣故。雖有芽，但收穫後
自然會入休眠狀態。

二、種植應選大粒的，小粒的易混毒素
病薯。（郭國柱）

胡錦鳥每對七百元

繳費可入飼鳥協會

【問】：一、胡錦鳥何處有賣？價格約需
多少？

二、如何加入飼鳥協會，手續如何？（
雲林縣褒忠鄉六塊厝三號張榮參）

【答】：一、洋鳥類主要生產地是新竹
市和苗栗鎮公館鄉，胡錦鳥目前市價，成鳥
每對七百元，雛鳥每對三五〇元。

二、填一份入會申請書，一寸半身相片
二張，常年會費六十元分上下半年繳納，入
會費十五元。（臺灣省飼鳥協會推廣委員會
邱見堂）

金門種櫻桃蘿蔔

辣味較弱味甜嫩

【問】：上月中旬本人使用堆肥及少量
硫酸作基肥，栽培櫻桃蘿蔔，發芽後十五天

養鴨新藥

安全可靠

效力高強

預防治療劑

安全新生素

SAFETY·NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的
鴨病特效藥

主治症：鴨瘟（軟腳）、白喉、赤白痢、胃腸炎、
丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他惡疫。


絕無其他副作用（保證沒落蛋）

·全省到處均有出售



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉高埔路14-3號



衛審藥字第〇〇〇〇〇〇號

藥農

的格合驗檢府政



能効証保 實確份成

牌東大

藥農牌東大用愛請敬



鳳豆茶西果藤
梨類葉瓜樹菜

藥効特，害虫，害病

柏水

送即索函表錄目細詳

司公限有份股業工學化元東大

號七七八四話電號七九一話民三區市巾中臺