

### 預防

普通所謂脫腸就是「陰囊赫爾尼亞」多屬遺傳性，所以如果知道原因是來自公豬，下次配種時切不可配同一頭公豬，如果來自母猪，而所生頭數很多時，應淘汰母猪，以防赫爾尼亞的發生。此外，狹窄的豬欄，飼養頭數不能太多，否則也容易發生這種現象。

\* \* \* \* \*

栽培鐘麻，比較黃麻容易，精洗麻的產量，也比較高，可惜目前的鐘麻品種，還不能抵抗線蟲病。但是祇要能和水稻輪作，田間連續積水一個月以上，就可減少線蟲的發生。

問：如會發生黃麻根瘤線蟲病的土地，可否栽培鐘麻？  
答：目前的鐘麻品種，還不能抵抗線蟲病，但比較黃麻具有抵抗力，栽培鐘麻，應慎重選擇土壤，排水良好的砂質或砂質壤土，播種前採集土樣，或預種番茄和米豆，測定土壤裏線蟲的分佈情形，嚴重的不能栽培鐘麻。

問：生育期間常會發生何種病蟲害？應用何種藥劑防治？

答：除線蟲病外，主要病害為膜折病，其他如立枯病，白絹病，炭疽病等多在催線蟲病後容易感染。

## 鐘麻

## 水稻

一、預防鐘麻膜折病，應該適當輪作，一般來說，如果前作物是水稻的麻田，病害較少，如前作是甘藷、蘿蔔、花生等的麻田，病害發生使較多，播種前宜施行種子消毒，生長期發現病害，可用 Sammicron E.C. 一千倍稀釋液治療。

二、預防線蟲病，應與水稻輪作，田間連續積水一個月以上，可以減少線蟲，或於播種前十五天，使用殺線蟲劑「毒線蟲」D.B.C.P. (百分之七十 Fumazone 乳劑) 每公頃用藥量二十公斤，可殺滅土壤裏的線蟲。

三、蟲害則有葉螟、造稻蟲、浮壓子等較多，都可用安特靈或賽文驅除。

問：行株距多少最適合？施用肥料量各多少？  
答：適度密植，不但可增加產量，又可抑制腋芽生長，提高纖維品質，行距不宜超過四十五公分，株距約十公分。施肥量可參照黃麻，每公頃的標準施用量如下：硫酸銨四百至六百斤或尿素一百七十五至二百六十公斤。過磷酸鈣一百一十至二百二十公斤，氯化鉀一百六十至二百四十公斤。上述肥料量應依土質酌情的量，分次施用。


問：如管理一切徹底周到，每分地產量多少？

答：土質適宜，管理周到，每分地精洗麻產量可達三百公斤以上。

問：收購價格與水上青皮是否同樣？

答：鐘麻較黃麻容易栽培，精洗麻產量高，但品質比黃麻略差，所以精洗麻每公斤要低二角錢。(臺南棉麻試驗分所)

## 可以預防線蟲



「庭家村農」好材料，研究婦女好快，(家)層咱善贊幫！(壞不也)，內(家)層咱善贊幫！太太好(讚稱)嚕呵家大



「地園左農」大家試氣免不，覽者試氣免不，愛總攬圖(默幽)科笑，裁主會輯編好



「年豐」農務服「年豐」，界林農務服「年豐」；知人農產生着為農閱訂，牌農掛有會農閱訂，財發大產增君祝