

大豆

- 一、修通排水溝，以利排水。
- 二、多施磷肥鉀肥，以增加抵抗力。
- 三、已經成熟的大豆，應提早收穫。
- 四、參考過去颱風方向，順風作畦。
- 五、種植在低窪處的大豆，雖未到收穫期，亦應提早收穫，以免沖失。
- 六、颱風來臨前，應再行培土一次，以防倒伏。
- 七、大豆最忌積水，常巡視園圃，注意排水。
- 八、已收穫的大豆，應堆置高處，並加覆蓋鎮壓，以防濕風吹。
- 九、颱風來臨前不要播種。
- 十、颱風過後，尚在生長期中的大豆，應補施少量氮肥，以恢復生長，並噴射「大生廿二」或「大生七八」四百倍液，以防止紫斑病和銹病的發生。
- 十一、颱風過後將屆收穫期的倒

如何減輕

大豆、甘藷、花生、鳳梨的颱風損害？

- 伏豆株，應即行收割，以免發芽。已經收割的豆莢，應趕快曝曬，以防發酵變質。
- ### 甘藷
- 一、修整田畦，開通排水溝以利排水。
 - 二、低窪處的甘藷，如近收穫期

- 以免莖覆溝底，浸水腐爛。
- 七、已經收穫的甘藷莖，應妥為放置，以免水濕。
 - 八、颱風來臨前，不宜插植。
 - 九、颱風過後，應迅速排水，以防腐爛。生長期中的植株，應施少量追肥，以恢復生長，並噴射 DDT 乳劑或「賽文」，以防治蟲害發生。

- 二、成熟的花生，應從速收穫。
- 三、低窪處的花生，播種後超過一百天的，應提早收穫以免沖失。
- 四、收穫的花生，應堆置高處，覆蓋物應妥加鎮壓，以防風吹。
- 五、颱風來臨前不要下種。
- 六、颱風過後，園圃積水應立即排除。
- 七、已成熟未及收穫的花生，颱風過後應即收穫，以防夾果腐爛發芽。
- 八、生長期中的花生，颱風過後應做輕度中耕、施肥，並稍加培土，以恢復生長。
- 九、颱風過後，未曬乾的夾果應立即曬乾，以免發

省府農林廳

鳳梨

- 十、颱風前未翻莖的植株，颱風過後應補行翻莖，以防止不定根的發生。
 - 十一、颱風過後，應即中耕，使土壤鬆，助長塊根生長。
- ### 花生
- 一、整理排水溝，以利排水。
 - 二、坡地植株被水沖倒時，應即扶正並培土。
 - 三、清理園地。
 - 四、坡地應開安山邊溝，以防表土沖失。
 - 五、鳳梨影響品質。

旭牌植物增收聖劑

綠培靈

增加產量防止落花落果

技術：日本旭化學株式會社
製造：新豐收化工廠
台北市延平南路127號

使用優良農藥必先選用優良器械



胸掛散粉散粒兼用機



家庭園藝用約型噴霧機

開路生·可利生
大生 22·大生 78
快粒多·純美谷濃
水銀波爾多·多德
賽文·萬能展着劑
新米隆·土壤線蟲劑
(FUMAZONE 70F)

一自辦進口·廉價供應一

惠光貿易有限公司 永豐農藥行
臺南市東門路140號 電話：4971