



高雄六八號水稻

桃園一帶可以試種

【問】：一、高雄六八號新稻種，對二期作較枯病的抵抗力較強，未知北部適宜嗎？泥土較粘以何品種為宜？

二、地形稍高，需水量多，灌溉較困難的地方有何抗旱力較強的品種？（桃園縣蘆竹鄉大竹村游金星）

【答】：一、新竹區有部份農民自高雄區帶回高雄六八號稻種做第二期作，並參加當地全省性稻作增產競賽，結果據新竹區農改場農藝課張課長說成績優良，由此可知可適合於桃園一帶泥土較粘的地區。

二、至於地形高灌漑水較困難，應改種陸稻或雜糧作物，如一定要種水稻，最好先考慮種在來稻。又本品種在遷來稻中可算稍具抗旱力。故建議多用幾個品種加以試作較妥。（謝英鐸）

冬季糊仔油菜

不適臺北地區

【問】：一、臺北市郊在冬季適于糊仔栽培日本油菜嗎？

二、怕燒爛嗎？

三、種植油菜以何品種為宜？會影響一期作水稻插秧嗎？（彰化縣竹塘鄉土庫村十

六號黃文和）

【答】：一、臺北地區的氣候，雖可栽培油菜，但作為冬季水稻田糊仔栽培時，恐生育期間過長，無法趕上一期水稻插秧，又收穫期適遇雨季，所以並不理想。

二、燒爛對油菜的影響程度並無試驗記錄，但燒爛過於厲害時，對一般作物均可為害，油菜熱難例外。

三、臺中特一號，及臺中特三號品種各有優點。前兩者產量高，但生育日數較長，且需較為精密的栽培管理；後者生育日數較短，栽培較為粗放，但產量較低。就地域性而言，新竹特一號較適於苗栗以北地區；臺中特一號及特三號較適於臺中以南地區。（劉富文）

山坡柑桔園間作鳳梨

每分地需三千五百苗

【問】：本人在山地種植柑桔希望間作鳳梨，請問：一、以何品種為適？株行距若干？二、種苗何處有賣？價格如何？三、兩分山坡傾斜地要種苗多少？四、應利用何種栽種方式為宜？（嘉義縣竹崎鄉復金村三十九號張淡）

【答】：目前臺灣的鳳梨品種以正常開英種為佳。畦距一百公分，行距五十公分，株距二七至三十公分，每公頃栽植四萬至四萬五千株，故二分地需要八千九百株，但在柑桔園間作時，可看實際情形酌量減少，二分地約需六至七千株。山坡地栽植等高密植，覆蓋稻草，並設有山邊溝為理想。正當開英種在南投縣名間鄉一帶較多，可向名間鄉新厝村陳深江先生接洽代為選購，每苗價格約為三至四角。（黃季香）

醃李要用未成熟果

加鹽糖紫蘇和甘草

【問】：一、醃鹹李要配鹽若干？

二、用何容器為宜？

三、醃用李子成熟度如何？



市場何需種醃、四李



日產化學株式會社出品 日星牌農藥

飛佈達

（ヘプタ粉劑）
防治土壤害蟲

克氣笨

（アカル 338 乳劑）
防治柑橘銹痺、紅蜘蛛。

（サルトン水和劑）
防治蔬菜、菸草、麥等害蟲


硫黃劑

老牌（ホモグリーン）
促進植物生長荷蒙劑

荷蒙綠




日本丸山製作所出品各種噴霧機散粉




排氣量：28cc
重量：12公斤

每 台
NT \$6,500



工作效率：
每 分 地
20~30分

每 台
NT \$1,850



工作效率：
每分地30~40分
每 台 NT\$830



臺灣總代理 臺灣華豐行

臺北市南京西路五號之一
電話 47374·40550·40660



合於何種菜類？
四、甘藷宜消毒嗎？
臺東縣臺東鎮豐源里二九號

【問】：一、浸漬消毒水溫度多少？普通水溫攝氏四度如何加溫？

蔬菜種子消毒

【問】：一、浸漬消毒水溫度多少？普通水溫攝氏四度如何加溫？
二、浸漬消毒需時多少？如浸漬過久，種子會發生何種反應？
三、蔬菜種子消毒最適當於何種菜類？
四、甘藷宜消毒嗎？
【答】：一、李子一百斤配食鹽二十斤，另加紫蘇葉浸漬處理。
二、醃漬容器要用木桶。
三、採用未熟李為原料勿用過熱的。
四、粗漬以後加配糖和甘草等增加風味。
（朱仙和）

香瓜裂果原因很多

避免乾濕劇變為主

【問】：本人種香瓜約一分多地，現已成熟，可惜約有半數會裂開，過了一兩天就開始腐爛，原因何在？（斗六鎮龍潭里九號張生財）
【答】：一、香瓜（甜瓜）裂果原因有幾種：
（一）長期的乾燥氣候後，驟遭下雨。
（二）土壤過乾，然後灌水或下雨。
（三）瓜蔓的葉不多，並且不健全。
（四）過熱。
二、預防方法：
（一）深耕，多施堆肥，勵行畦面覆蓋，畦溝常留淺水。
（二）噴射大生七八，防治病害，保全葉部，使蒸發作用良好。
（三）選擇排水良好的土地，並且注意驟雨後的排水工作。
（四）追肥量不可太多，不可偏用氮肥，氮肥肥並重為宜。
（五）適期採收。（王進生）

郭田山

【答】：一、普通用水銀劑消毒時，水溫不超過攝氏二十五度為宜。如果攝氏四度，可以用電氣或火力加溫至適溫為止。

二、普通浸漬時間為三十分至一小時，浸漬時間，以能達到滅菌的限度就可。如浸太久，種子內容物會溶出。
三、豆類普通用五百分之一福保根粉劑消毒。甘藷、花椰菜用阿拉散拌種為宜。馬鈴薯宜用烏斯普龍八百至一千倍液消毒。
四、甘藷種苗可用西藥生石灰拌種（粉衣）可用種薯十公斤，西藥生石灰十公克的比率。



柿子種子隨收隨播

過早過落容易落果

【問】：一、栽培臺灣柿何時播種？
二、自播種後至接木需幾天？作砧木及接木用幾年生最好？
三、自接木至移植需幾天？
四、柿的落果原因和如何防治？（花蓮縣萬榮村六十號張金亭）

【答】：一、種子須在十一月至十二月間充分成熟採下後取種，即播為宜。
二、播種的幼苗約需經過一年半至二年，可用作砧木，施行嫁接。
三、自嫁接至定植，約需一至二年。
四、果樹落果原因最主要者有下列幾點：
（一）凡受粉不良所結成的果實，初期脫落之果實大多數可歸因于此。（二）開花期間及開始結果時，天氣過於乾燥。（三）果實發育期間，如結果過多而肥料缺乏時凡發育較差之果實可能脫落。（四）近成熟期受蟲害或果實蠅為害之果實容易脫落。（張振甫）

雞感冒注射鏈黴素

生軟蛋是有遺傳性

【問】：一、製造雞痘疫苗，有何應注意事項？
二、雞眼睜不開，精神萎靡用手撐開，內有水份很多，拭去水份，塗以金黴素眼藥，每日二次，三、四日後略好，但仍不能睜



品藥源益
優良品質的標誌

最新特製性環狀劑
長效胺
注射注

最新廣效抗生素
源益四環素
注射注

豬肝疫腸炎下痢
氣胺素
注射注

強心利尿解熱解毒
安彼妥
注射注

益源製藥所出品
台北市羅斯福路三段二二號

農林廳 華興 檢驗合格
TRADE MARK

品質標準
農友牌 BHC
効力絕卓

成份：
粉劑...1.5% 3%
乳劑...10%

●興華企業股份有限公司●
台南市安平區新西路37號
電話...2204號



原，請問是何病？發現傳染性很大，應用什麼藥物可以治療？

三、木人的鷄羣用同樣飼料，但有一隻專生軟蛋，它的上代也有同樣情形，故懷疑有無遺傳性？

四、擬覓求一些天種火鷄和純良鷄種蛋，若在海島，無法入手，可否介紹？可利用郵購否？（關嶼椰油徐培遠）

【答】：一、製造鷄痘疫苗要衛生嚴格設備，不能隨便製造，至於製造過程等，台端如有興趣，欲知此種詳細情形，請函淡水農林總家畜衛生試驗所洽詢。

二、鷄眼腫不開，腫大，其中並有液體，這種鷄隻患患感冒病，通常稱為「咯布」病，眼部用金鐵素軟膏塗抹，效果好，應繼續治療。全身治療可施行肌肉注射一克量之鏈黴素，即可痊癒。

三、生軟蛋除營養外與遺傳是有關係的，有些鷄隻因為吸收鈣質的消化能力弱，容易生產軟殼蛋。

四、大型火鷄可向鳳山高雄農業改良場畜牧課洽購。

塗擦煤油可除牛壁蝨

牛鼻流水要注意管理

【問】：一、牛身密佈圓形蟲用何藥可治？

二、有一隻牛經常流鼻水。是否感冒？何藥可治？

三、山地養牛，應經常儲存何種藥物？（屏東高樹泰山村泉泰商店柳樹青）

【答】：一、牛身圓形蟲，大概是牛壁蝨，除經常抓去外，可用煤油（洋油）塗擦患部，隔十日再塗擦一次可根除。

二、牛隻經常流鼻水，可能是患感冒，此病在管理上，應給牛隻比較溫和的牛舍。牛舍通風應良好，鋪墊乾燥的乾草，給與充分的飲水。飲水中可放一湯匙碳酸鈉和食鹽，可助此病痊癒比較快。

三、山地養牛應常準備藥物如酒精、碘

酒、BHC、DDT、硫酸鎂、阿客不靈（Acaprin）針藥等。

鑑別雌雞雄雞

要有相當訓練

【問】：一、我想飼養來亨產卵雞但不

能鑑別雌雞的雌雄，請教在孵出一、二天和二、三週時鑑別雌雄的方法。

二、仔雞的管理和飼料應如何？（南投縣埔里鎮西門里中正路三一三號王哲文）

【答】：一、關於來亨雞及其他產卵雞的初生雌雄鑑別，要在孵出時進行。根據已退化的生殖器的痕跡，在很亮的燈光下，將初生雞的肛門下緣翻出，在其下緣有突出的一小粒者為雄雞，無者為雌雞，但這種鑑別要經相當訓練，有經驗之後才有把握，目前已發明雌雄鑑別器，用有光源附帶的玻璃管由肛門插入初生雞的腸中，在其背脊下，找

視睪丸或卵巢來分別雌雄。二、三星期後的雌雞，尤其是來亨雞很容易分辨出來，雄的冠大而稍紅，腰亦較雄的為粗，此外雌雞頸項亦較粗長。

二、雞雞的管理，主要者須注意溫度與保持乾燥、衛生等，飼養上要給予平衡飼料

詳細的飼養管理情形，請參照本刊以前出版的養雞手冊



賽能乳羊適於本省

可往臺中洽購仔羊

【問】：一、乳羊飼養方法如何？有無

二、在臺南新市鄉一帶何處可買到？仔羊價錢如何？

三、乳羊到了發情期何處有公平可交配

最好的獸藥
最佳的效能
Veterinary Medicine




綜合素 強力治療用針劑

適應：豬、牛、馬、羊、狗及家禽傳染性、細菌性、化膿性、諸疾患。
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三八號

家禽的救星
效能如仙丹

禽聖片 A.C.M.



專家SITON博士提供配方

適應：家禽、雞、鴨、鵝、鴿子等傳染性、細菌性、諸疾患、投藥方便。

農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三六號

外銷東南亞自由國家

精美說明書備索 藥房飼料行有售

太平洋製藥有限公司

臺北市中山北路一段一〇五巷九〇號

尿素

尿素肥效等於硫酸銨22倍

素中性連續使用保證無害

—其他化學肥料—


磷酸鈣	過磷酸鈣	硝酸銨	化成銨
-----	------	-----	-----

—成份保證 肥效宏大—

台灣肥料股份有限公司

台北中街九十一號 電話：二五六一

好消息 鷄白痢新藥出現了!!



各地大藥房均售



？每次交配價錢如何
？臺南新化種畜場的
公羊可否供外界交配
之用，手續如何？

四、目前本省南

公母二隻，成熟後互予交配，會因血統相同，而使第三代子兔的體格退化嗎？

二、家兔痢疾爲何發生，能否傳染？請示治療方法及藥品。（南投縣水裡鄉永豐村九五號陳純仁）

【答】一、乳羊飼養手冊，請向農復會畜牧組索取。

【答】：一、同胎公母互相交配，後代必有影響，即所謂近親繁殖，立即不致有很大影響，數代後可能有退化現象，如不做育種改良工作，關係較少。

二、新市附近無乳用羊出售，可到臺中市瑛仔頂三民路三段富山乳羊場洽購。

三、乳羊發情後可到新化畜產試驗所人工授精中心請求人工授精。

四、本省飼養「撒能」種乳羊較合宜。

(黃立輝)

純種家兔自交會退化

家兔下痢主要靠預防

【問】：一、純種紐西蘭母兔所生子兔

二、家兔下痢的原因：①有球蟲病感染，②有攝食附有雨水的青草，③青莖類本身的水分過多，且突然於一日之內攝食太多，④飼料變壞。其治療方法：①如球蟲病則即消毒，使不再傳染其他兔，②如是飼料關係，則應速從這方面去改善，③如飼料中加入消毒藥或粉百分之1，連續三天，停一週再服三天，每個月如此做一次可預防球蟲病。要注意：家兔發現下痢後，治療十分困難，最好是事先預防。（黃立羣）



農作物增收劑
ネオゲン



◎效果◎

①水稻：秧苗健育，預防倒伏。粒質良好。②果樹：樹叢旺盛防止落果，實甘味，良質果粒，早期多收。③蔬菜：促進活著，養成健實豆類菸草提早收成，得宜連作。④茶桑：樹機旺盛，增加葉綠素，增收良葉。⑤花卉：強壯，收量增加。

日本農林省登錄生第3149號

臺灣總代理 豐裕農藥行
員林鎮民生路230號 電話583號

一切農作物增收聖劑

豊^ホ豆^ヘ
培^ク
緑^リ

技術：日本旭化學株式會社
製造：新豐收化工廠
臺北市延平南路127號

增加你的收入請栽培：

日本藤田原裝大五寸人參子	美國四粒球原裝丸型淨蔥子	美國加州大粒甜椒子	生地黃(中藥四川種苗)	荆芥子(中藥)	南風早、45天花菜子	極早生55天花菜子	新收良甲生50天高梨菜子	其它國內外種子在庫豐富備有目 金皮長種茄仔條(元條件)長度
--------------	--------------	-----------	-------------	---------	------------	-----------	--------------	----------------------------------

、早生天青粉菜包心白菜子
、新生3030天黑菜包心白菜子
、新理想355天包心白菜子
、新夏詩355天包心白菜子
、潮洋一號西瓜子
、雙頭正齊大條刺瓜子
、純正柿型蕃茄子
、優良瓠架型蕃茄子
、改良矮性皇帝茄子
、各種早中晚茄子類

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號（菓菜市場前）
分行：永靖鄉永興路六十一號（永靖農會邊）
郵政劃撥諸中字二〇八四五號