



【問】：一、浸漬消毒水溫度多少？普通水溫攝氏四度如何加溫？
二、浸漬消毒需時多少？如浸漬過久，種子會發生何種反應？
三、蔬菜種子消毒最適合於何種菜類？
四、甘藷宜消毒嗎？
臺東縣臺東鎮豐源里二九號

蔬菜種子消毒 所用藥劑不同

【問】：一、香瓜(甜瓜)裂果原因有幾種？
二、預防方法：
三、自接木至移植需幾天？
四、柿的落果原因和如何防治？(花蓮縣萬榮村六十號張金亭)

【問】：本人種香瓜約一分多地，現已成熟，可惜約有半數會裂開，過了一兩天就開始腐爛，原因何在？(斗六鎮龍潭里九號張生財)

香瓜裂果原因很多 避免乾濕劇變為主

【問】：一、李子一百斤配食鹽二十斤，另加紫蘇葉浸漬處理。
二、醃漬容器要用木桶。
三、採用未熟李為原料勿用過熱的。
四、粗漬以後加配糖和甘草等增加風味。(朱仙和)

【問】：一、普通用水銀劑消毒時，水溫不超過攝氏二十五度為宜。如果攝氏四度，可以用電氣或火力加溫至適溫為止。
二、普通浸漬時間為三十分至一小時，浸漬時間，以能達到滅菌的限度就可。如浸太久，種子內容物會溶出。
三、豆類普通用五十分之一錫保根粉劑消毒。甘藷、花椰菜用阿拉散拌種為宜。馬鈴薯宜用烏斯普龍八百至一千倍液消毒。
四、甘藷種苗可用西藥生石灰拌種(粉衣)可用種薯十公斤，西藥生石灰十公克的比率。

【問】：一、栽培臺灣柿何時播種？
二、自播種後至接木需幾天？作砧木及接木用幾年生最好？
三、自接木至移植需幾天？
四、柿的落果原因和如何防治？(花蓮縣萬榮村六十號張金亭)

【問】：一、種子須在十一月至十二月間充分成熟採下後取種，即播為宜。
二、播種的幼苗約需經過一年半至二年，可用作砧木，施行嫁接。
三、自嫁接至定植，約需一至二年。
四、果樹落果原因最主要者有下列幾點：
一、凡受粉不良所結成的果實，初期脫落之果實大多數可歸因于此。(開花期間及開始結果時，天氣過於乾燥。)
二、果實發育期間，如結果過多而肥料缺乏時，凡發育較差之果實可能脫落。
三、近成熟期受蟲害或果實蠅為害之果實容易脫落。(張振甫)

【問】：一、製造雞痘疫苗，有何應注意事項？
二、雞眼腫不開，精神萎靡用手撐開，內有水份很多，拭去水份，塗以金雞素眼藥，每日二次，三、四日後略好，但仍不能癒



農林廳 華興 檢驗合格

TRADE MARK

品質標準

農友牌

力絕 效卓

BHC

成份：粉劑...1.5% 3%
乳劑...10%

●興華企業股份有限公司●
台南市安平區新西路37號
電話...2204號

最新廣效抗生素

源益四環素

藥性安定奏效迅速

灌射注

最新特異性殺菌劑

長效胺

灌射注

強心利尿解熱解毒

安彼妥

灌射注

益源製藥所出品

台北市羅斯福路三段二二號