

### 植物促進生育劑

效果確實  
信用可靠  
應供貨現

# 2571

總經理：

## 信承農產行

溪湖鎮平和里員鹿路66號

電話 261 號

### 農作物增收劑 ネオゲン



綜合微靈要素葉面噴劑  
**ネオゲン**  
クラウン化成株式会社

◎效果◎  
①水稻：秧苗健育，預  
防倒伏。粒質良好，落  
果樹：樹質旺盛，果  
實甘味。盛期收穫，粒  
果實多。②蔬菜：豆  
類：莢果飽滿，得宜  
連作。③茶葉：樹體  
茂盛，增加產量。④  
盛葉：增加綠素，樹  
量增加。⑤花卉：強  
壯，收量增加。

日本農林省登錄生第115號  
臺灣總代理 豐裕農藥行  
員林鎮民生路230號 電話583號

**重肥** 中剪後，立即施用氮，磷，鉀三要素。施用量因母樹的大小而異，普通樹冠直徑約八十公分的，每株宜施氮素八至十二公克，磷素三公克，鉀素五公克。母樹在秋冬茶期中絕不採摘，防止新梢側芽的發育，至於冬期施用堆肥和春茶前的施肥都照常舉行。至「春插」取梢後，就把母樹行中剪枝和施一次肥，以促進夏梢的養成。在為六、七月間「夏插」用。

**選擇適地造苗圃**

**位置** 要選擇地勢平坦，土壤酸性，避風近水源的地方。

苗床以地表五十公分以下的酸性心土，酸鹼值在四·五至五之間的砂質壤土或粘土都可以。如果是粘土，應混合三分之一的河砂。苗床最忌土壤裏有地下害蟲、線蟲和腐爛細菌，所以要採用心土，最好先用BHC或地特靈殺蟲，然後造苗床。

**造床** 苗床寬約一·二公尺，可以便於扦插和拔草，長度可隨地形而異，高度以水位的高低和水源的難易而不同，普通以二十公分為度。苗床土粒愈細愈好，要先把心土細碎，混



苗茶的成育法插竹用應

入河砂攪拌均勻後作畦。

**消毒** 苗床除了在碎土後加BHC粉，或地特靈等殺除臺灣大蟋蟀、白蟻等害蟲，和Dowpon等除草劑外，苗床造成後，還要用「毒線蟲」二十倍，在苗床裏每隔三十公分，深十至二十公分，用土壤消毒注射器或細竹，插一小孔，注入溶液三至五立方公分(C)，立即覆土，用草袋、牛皮紙蓋好，防止蒸發和日晒，這樣可以把土裏的線蟲全部殺死。這項消毒工作，須於扦插前兩星期完成，以免阻礙扦插苗的發根。

**遮蔭** 苗圃的蔭架有兩種，第一種是不頂高架，用水泥柱離地面高兩公尺，每隔四至六公尺設一支，架頂用竹竿做樑，上蓋竹片，遮蔭的程度以減少日照光度百分之七十為宜，至於材料方面，可就地取材，不一定要

用竹片。

另一種是斜面低蓋，和一般蔬菜苗圃相似，頂蓋斜面如果是固定的，應設法防止日光射入苗床，如果用活動的，要以不妨礙每天澆水為原則。

### 扦插技術要精細

**選擇** 在苗床培育的當年新枝條，到成熟時就可採用，根據平鎮茶試所試驗結果，採苗時要注意以下六點：

- 一、中部的發根率最高，側芽如米點般細小時就可以採取，如果側芽已經發育到長成小葉時，表示已經過期，不能再育。
- 二、插穗的長短，在六至十二公分間的並無明顯的差別，短的發根比較迅速，但苗床水份稍嫌不足時，就有枯乾的危險。
- 三、插穗上留母葉兩葉或一葉的，也沒有明顯的差別，但是，大葉種蒸發面大，以留一葉為宜，小葉種留一、二葉都可以。

(未完，下期續)