

，品質好，抽苔遲，產量高，如果和「Minsterland」(ミンスターランド)等比較，有如下的五個優點：

(一)除了在下月中旬播種的較差外，其餘月份播種的都比較後者要好。

(二)「牛若丸」的株勢是直立性的，全株所佔空間，比了後者的半匍匐性為小，所以適於密植。

(三)因為它的株勢直立，所以通風良好，在雨季時，葉部腐爛的現象和露菌病發生的機會，都因而減少。

(四)這個新品種的植株，較本地種和「Minsterland」都重，每株重約六十公分。

這個新品種的植株，也比後兩種要高五成，收穫時，容易整修，而且省工。


(五)每十公畝的產量，約有二千五百至三千五百公斤，較本地種等增產約一成半至兩成。

播種過遲 要防抽苔

這個新品種的播種期很長，從八月中旬到十二月之間，隨時都適於播種。

如果在二月下旬以後播種，成績就差了，因為那時播種後約五十天，就有四成左右會抽苔，而且二月氣溫太低，生育比較慢，在短短的五十天以內，不會有很好的產量，但是比了本地種還是好的，因為本地種如果在二月下旬播種，只要經過四十天，便全部抽苔開花了。

換句話說，晚期栽培，還是用「Minsterland」的好。



較比種品菜菠菠

早期栽培
栽培「牛若丸」

可先催芽，如果發現因為受高濕障礙而發芽不好的現象，可以先催芽後再播種。

催芽的方法，是先把種子浸漬在清水裏一晝夜後，拿出來放在屋角，堆積成五至八公分的厚度，用草蓆覆蓋，使它保持適當的水分。

在堆積期間，果皮開始腐化時，要使胚能充分的透氣，預防窒息。

經七、八天，即播種前一天，再把種子浸漬在清水裏約十至十二小時，那時候，大概有百分之八十的發芽率，隨即覆土，使它能順利的發芽生長。

「牛若丸」菠蘿菜的種子，在嘉義清和種子行可以洽購。

怎樣防止黃麻的颱風損害？

一、麻田四周開排水溝，田區較大時依照地形在田中加開水溝。

二、收穫後的精洗麻、粗幼麻，應妥為貯藏。

三、未曬乾的精洗麻或粗幼麻應緊急收拾，放置屋內風乾，並要翻覆以免腐爛變質。如粗幼麻放置過久變質則應改製精洗麻。

四、浸在水溝或河

流的精洗麻應緊急撈取，以免沖失。

五、颱風過後，麻田的積水應立即排除，以免根部腐爛阻止發育，或發生水根，影響麻質。

六、粗麻淋雨後應浸入麻池，改製精洗麻。如精洗好的精洗麻，則應重新曬乾以免變質。


鳳梨界的大革命，較電土方便的最新藥劑已出現！

鳳梨花芽分化促進劑提早61天可收成

政府檢查合格工廠



愛果速



使用方法：

利用貯積露水之鳳梨株，用一片愛果速以喇叭管灌入鳳梨心底芯部不可傾出芯外。

處理時期：

處理鳳梨時期對是否能提早花芽分化及分化百分率之高低關係，主要則本劑適用於清明、白露二季之一個月前後約較有顯著之效果使花芽分化率達至90%以上。

愛果速片劑容量250片：

- 1 使用簡便，提高工作效率。
- 2 果實之成熟期整齊，可減少多次採收之煩。
- 3 植株之生長點迅速引起分化抽穗顯較自然分化時為集中。
- 4 提早分化後之果實與自然結實者相同之品質。
- 5 提早採取之果實較自然生長時期之利順優厚。

其他主要產品種類：

- 1 快豐收液劑 (植物生長賀爾蒙劑)
- 2 把拉松 (殺蟲劑)
- 3 馬拉松 (殺蟲劑)
- 4 葉綠元液劑 (微量元素綜合劑)
- 5 葉綠元結晶 (尿素ホルモン劑)
- 6 P. M. 安特靈

神農化工廠股份有限公司出品

臺灣省南投縣名間鄉中正村彰南路三之一號