

微酸土壤適種鳳梨

秋季栽植愈早愈好



【問】：一、平地種鳳梨，表土約五英寸，下面是砂石的砂質地是否可以？

二、每分地能種幾株？

三、何時種植最適宜？

四、自定植到收穫每分地的肥料三要素須多少？

五、如果在九、十月種，像今年初無雨是否會旱死？

六、山地種植在何時為宜？（高雄縣美濃鎮廣林里六十三號鍾天綠）

【答】：一、砂質平地可種鳳梨，但土壤要呈微酸性反應（五至六）為宜。

二、每分地可栽植四千至四千五百株。

三、鳳梨的栽植適期是八至九月間，愈早愈好。

四、自栽植至採收第一回果實止，每分地四千株，每株氮素十六公分、磷素四公分、鉀素十六公分計算，共需硫酸銨三百二十公升或尿素一百四十公升，過磷酸鈣八十八公升，硫酸鉀一百二十八公升，分五次施。

五、栽植後遇下雨，鳳梨苗立即發根生長，如栽植太晚（十日以後）且栽後無雨，土壤太乾燥時，雖無發根現象，但不會枯死，到春天降雨後立即恢復生長。（黃季春）

花豆春秋播種

桂竹用途廣大

【問】：一、花豆單位播種量若干？二、夏季可種否？一年可種幾期？三、市價如何？四、桂竹有何特殊用途？可出口嗎？好的麻竹筍乾，價格如何？可否加工？（花蓮縣瑞穗鄉富興村六鄰十六號林萬成）

【答】：花豆播種量每公頃需六十至六十五公升。

二、在花蓮二至四月間，九至十月均可播種。

三、花豆普通以採收豆仁，作為糕餅餡的原料，如想採收嫩莢，請栽矮性菜豆為宜。

可在菜市場出售，每臺斤約一至二元。如乾的花豆（豆仁）每臺斤三至四元。

四、桂竹林最適坡地的水土保持，因為它的鞭根又長又密，適於山谷或河川兩岸坡地種植，嫩筍可食用和加工，竹竿適於各種支柱和供作手工藝品的原料，竹絲（乾麻竹筍製品）的零售價，每臺斤約十四至十五元。（王進生）

小葉種金針菜

花未開先採收

【問】：一、種植金針菜的行距若干？臺灣現有幾種金針菜？以何種為最佳？

二、金針菜怎樣採收？怎樣加工才能變成金黃色，符合銷售的要求？（臺中縣新社鄉中和村鳳林三十之三號葛維業）

【答】：一、金針菜行距約六十公分，株距三十至三十五公分。臺灣現有小葉種和南洋種兩個品種，品質以前者為佳，但產量較差。各有一得一失。

二、金針菜的採收，宜在花蕾尚未展開以前採收。如果開花後收，花約含有很多花粉，會影響品質。採收後的花蕾（開花前一天），用火或電力脫水加工為佳。太陽曬也可以。但在事前須殺死細胞，然後晒至乾燥為止。（王進生）

鄉鎮農會獸醫人員

祇能按實收取藥費

【問】：鄉鎮公所或農會獸醫人員為農家醫療病畜，收費標準，有何規定？

【答】：一、農林廳有規定，公職獸醫人員為農戶醫療病畜，除由公所農會購置藥品供用，按實收取藥費外，不得向農戶增收任何費用。但因有些公所農會限於經費，並沒有切實實施。

二、農戶飼養家畜，可向當地農會，申請投保，就能享受醫療優待，以免不法公職獸醫人員私收費用。（農林廳畜牧科）



來利福



FURELLA

好消息 鷄白痢新藥出現了!!
防治家禽白痢，傷寒，及其他各種疾病特效藥。
每雞一個月祇花一元藥費，保證百發百中既可安心，又可獲利。
預防：調配飼料壹壹貳倍。
總代理：調配飼料四四八倍。
英商卜內門洋碱公司
臺北市中正路一八〇〇號
國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號



英國卜內門洋碱有限公司出品

各地大藥房均有出售



益源藥 優良品質的標誌

最新特種性腺腺劑
長效腺
注射劑

最新廣效抗生素
四環素
注射劑

強心利尿解熱解毒
安彼妥
注射劑

豬肺炎腸炎下痢
氣胺素
注射劑

益源製藥所出品
台北市羅斯福路三段二二號