

### 新竹地區沒有插秧的稻田

## 請趕快改種雜作！

洪再傳

新竹區二期稻，到目前還有不少沒有插秧的，即使最近會下雨，也不必考慮再插秧，因為當地氣候，每年八月中旬以後的雨水，就不可靠了。為了避免損失，趕快選擇比較有利的其他作物。這裏介紹三種晚植的雜作，栽培得宜，收益並不比水稻差。

### 甘藷

品種：「新竹一號」和「沖繩一百號」，都是適合新竹地區栽培的優良品種，新竹一號尤其適合於晚植。

整地：本田犁起後，立刻整地插植，不要犁起後放置很久，以致發生乾燥。

糊醬：插植前，先做好土醬，把諸苗糊上土醬，就插植，可以提高甘藷的成活率。

插植：用斜插法，而且要密植，預防諸苗枯死，提高成活率。

管理：插苗覆土後，用腳底鎮壓；因為鎮壓而

發生的空隙，再用鋤頭耙平，這樣可以保持水分，提高甘藷的成活率。

產量：即使晚插的甘藷，每公頃仍有一萬五千至二萬四千斤產量。

### 大豆

品種：「十石」和「早生株矮」，到九月上旬還可以栽培。應該準備多約兩成的種子量，以便把不飽滿的種子先除去，提高發芽率。

土質：以砂質壤土肥沃土壤為宜。  
播種：最好採用條播法，行距約三十公分。當

植播開好後，先澆少量水，然後播種覆土，並且可以略為加深一點。

管理：發育後要提早中耕除草。

產量：平均每公頃約一千三百公斤，值八千四百元。

### 玉米

品種：「臺南五號」在九月播種的，產量很高。行距六十公分，株距二十公分，每穴播種兩粒。

播種：犁淺溝，深四至六公分，但可以土壤水分多少而定。

追肥：發芽後，施人糞尿等速效性氮肥，預防煤紋病，並維持生育後期的營養，使子實飽滿。


產量：八月中下旬所種的玉米，平均每公頃的產量有二千四百至二千六百公斤，售價約自九千六百元至一萬另四百元。

# 蜘蛛紅桔柑

· 傳 良 張 ·




(一) 在乾旱的時期，常常發現柑桔樹樹勢衰弱，葉部蒼白，嚴重的有落葉、落果情形，但是檢查柑樹，却看不出任何病蟲害。如果有這種現象，很可能是紅蜘蛛為害。



(二) 紅蜘蛛用普通肉眼不容易看到，但是用放大鏡檢視柑桔葉，就可以看到八支脚（成蟲）或六支脚（幼蟲）的紅色小蟲，尤其在葉背部份特別多。

(三) 柑桔紅蜘蛛很小，成蟲體長只有0.4毫米，紅色，左圖上右為雄成蟲，上左為雌成蟲，下面兩圖為幼蟲和卵。成蟲幼蟲形狀近似，為害葉、芽和果實，週年發生，尤其在無雨期時特別多。



(四) 防治紅蜘蛛最有效而經濟安全的藥劑，有二〇%鐵定旺可濕性粉一千倍，一·八五%開路生可濕性粉五百倍，和二五%克路生乳劑一千倍三種。葉子的表面背面和果實都應噴藥，越過到越好。