


蜘蛛紅桔柑


· 傳 良 張 ·



(一) 在乾旱的時期，常常發現柑桔樹勢衰弱，葉部蒼白，嚴重的有落葉、落果情形，但是檢查柑樹，却看不出任何病蟲害。如果有這種現象，很可能是紅蜘蛛為害。



(二) 紅蜘蛛用普通內眼不容易看到，但是用放大鏡檢視柑桔葉，就可以看到八支腳（成蟲）或六支腳（幼蟲）的紅色小蟲，尤其在葉背部特別多。



(三) 防治紅蜘蛛最有效而經濟安全的藥劑，有二〇%鐵定旺可濕性粉一千倍，八五%開路生可濕性粉五百倍，和二五%克氯笨乳劑一千倍。葉子的表面背面和果實都應噴藥，越週到越好。



新竹地區沒有插秧的稻田

請趕快改種雜作！

洪再傳

植溝開好後，先澆少量水，然後播種覆土，並且可以略為加深一點。

管理：發育後要提早中耕除草。

產量：平均每公頃約一千三百公斤，值八千四百元。

甘 諸

品種：「新竹一號」和「沖繩一百號」，都是適合新竹地區栽培的優良品種，新竹一號尤其適合於晚植。整地：本田犁起後，立刻整地插植，不要犁起後放置很久，以致發生乾燥。

糊醬：插枝前，先做好土醬，把諸苗糊上土醬後，就插植，可以提高甘諸的成活率。插植：用斜插法，而且要密植，預防諸苗枯死，提高成活率。管理：插苗覆土後，用脚底鎮壓；因為鎮壓而

發生的空隙，再用鋤頭耙平，這樣可以保持水分，提高甘諸的成活率。

產量：即使晚插的甘諸，每公頃仍有一萬五千至二萬四千公斤產量。

大 豆

品種：「十石」和「早生株矮」，到九月上旬還可以栽培。應該準備多約兩成的種子量，以便把不飽滿的種子先除掉，提高發芽率。

土質：以砂質壤土肥沃土壤為宜。

播種：最好採用條播法，行距約三十公分。當

品種：「臺南五號」在九月播種的，產量很高。行距六十公分，株距二十公分，每穴播種兩粒。

播種：犁淺溝，深四至六公分，但可以土壤水分多少而定。

追肥：發芽後，施入糞尿等速效性氮肥，預防煤紋病，並維持生育後期的營養，使子實飽滿。產量：八月中下旬所種的玉米，平均每公頃的產量有二千四百至二千六百公斤，售價約自九千六百元至一萬另四百元。

玉 米

成蟲體長只有○・四耗，紅色，左圖上右為雄成蟲，上左為雌成蟲，下面兩圖為幼蟲和卵。成蟲幼蟲形狀相似，為害葉芽和果實，週年發生，尤其在無雨期時特別多。

