

？劑草殺用施樣怎園梨鳳

春 季 黃

應用殺草劑殺滅鳳梨園雜草，不但可以節省勞力，減輕除草時對鳳梨植株的傷害，且可因及時除草而增加鳳梨的產量，可說是一舉數得的好方法。本文介紹鳳梨園的二種有效殺草劑，和施用的方法。

在鳳梨栽培上，除草工作佔有相當重要的地位，雖然，臺灣工資已算比較低廉，但是除草工資一項，就佔了鳳梨生產成本的二成以上，且當除草工作進行時，很容易傷害鳳梨植株，同時夏季雜草生長旺盛，常有人力除草不及之感。近年來，殺草劑發現很多，應用也很普遍，在鳳梨耕作上應用殺草劑，可以補救人工除草的種種缺點。

配合氣候效力大

「卡滅克斯」和「亞脫拉淨」的除草毒力，主要是由雜草根吸收而發揮，所以，殺草效果的好壞，受氣象條件影響很大。在乾燥季噴藥時，藥劑無法透入表土，為雜草根所吸收而發揮效果；相反地，在豪雨前噴藥時，藥劑容易為雨水冲刷流失，減低殺草效果。最理想的噴藥條件，是噴藥時期經常有適當的降雨量，而土壤保持着濕潤的狀態。

有效殺草劑二種

日前，經試驗認為，在鳳梨園效果很好的殺草劑，有下列兩種：
卡滅克斯 美國杜邦公司出品，每公頃每次用量三公升，稀釋三百倍噴佈。
亞脫拉淨 瑞士嘉基洋行出品，每公頃每次用量五公升，稀釋二百至三百倍噴佈。

一年分三次噴藥


第一次噴藥，應在鳳梨種植後，雜草未萌芽前（八、九月間）進行。噴藥後，如遇適當降雨，效果很好。
第二次噴藥，應在鳳梨種植後第二年，雨季初期（四至五月間）進行。

噴藥前，將鳳梨園除草一次，效果會更好。
第三次噴藥，應在第二次噴藥後三至四個月（即八至九月間）進行。

促進發育利增產

「卡滅克斯」每公頃三公升，或「亞脫拉淨」每公頃五公升，稀釋三百倍在鳳梨園表土上全面噴藥時，對鳳梨植株不但不發生藥害，且可促進發育，同時可因及時除草而減少肥料損失，增加陽光照射，進而提高產量，和農友們的收益。

以興農之農藥期待豐年之來臨



紋枯病特效藥

紋絕水和劑

水稻螟蟲之剋星

50% 富粒松乳劑
1.5% 3% BHC 粉劑



興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五九號

臺北連絡處：
臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六