


•物作料飼季春秋冬的良優•

苦·蕉·典·瑞



李

1

瑞典蕪菁，本來是一種蔬菜，可是，省農業試驗所自國外引進本省後，發現它的飼料價值，反比蔬菜大，尤其在冬春季青飼料缺乏時生產，很值得畜牧界的重視。

耐寒豐產營養好

當典燕壽作為飼料作物有如下的三個優點：
一、產量比甘薯高——瑞典燕壽每公頃收穫量

一、產量比甘藷高——瑞典蕪菁每公頃收量最少六萬公斤，最多可達十二萬公斤，比較一般甘藷每公頃四萬至五萬公斤，產量高出一倍。

的粗蛋白質含量，莖葉部份二、三%，塊根部份為〇・八八%，瑞典蕷菁的粗蛋白質含量，地上部葉身部份為三、三%，地下部塊根部份為一、二%。三、耐寒力比甘藍強——瑞典蕷菁冬季水田裏作到，一、二月低溫季節，能抗嚴寒霜害，為甘藍所不及。

笛里金最適宜

在臺灣推廣畜牧事業，如養豬事業、酪農事業

酸鋰四十公斤，氯化鉀二十公斤，過磷酸鈣十五公

瑞典蘿蔔可以種子直播，也可以育苗移植，以種子直播時，畦寬一·二公尺（包括畦溝行），行寬六十公分（每畦栽培二行），株距五十公分，作淺穴，每穴播種子三、四粒，上面覆堆肥少許。待子葉出土時，漸次間拔，每穴只留強苗一株。育苗移植時，苗期三十天，照上述栽培距離移植，撫育成長，直播栽培的塊根形狀，較移植栽培為佳，但是產量是一樣的。

直播或移植均可

此，不甚利植，自九月起即如前栽植，至十二月底爲最合適，自微鹹性至強酸性各種土壤都可栽植，因此，自海岸含鹽較多的輕分砂土，至高山強酸性的紅粘土，都能生育良好。

瑞典燕麥宜於溫涼氣候，生長迅速而繁茂，塊根發育肥大。生長的溫度，以攝氏十二度至二十度為最理想；幼苗期溫度超過攝氏二十二度時，徒長葉片，不結塊根。因此，本地秋植，自九月初開始播種，至十二月底為最適。

目前本省引進的瑞典獅青有青皮、青皮二種，紫皮種外皮露出土面部份呈青色，肉質淡黃；青皮種外皮露出土面部份呈紫紅色，肉質淡黃；青皮種較青皮種產量略高。

去年，至今年四月間送往臺灣大學作營養分析並供豬乳牛飼養，經過情形非常良好，各地農友都可以放心栽培。如果要種子，可函臺北市神化街一段五十六號農企事業公司，或高雄市建國三路二三號大豐子行洽購。

每公頃十六萬斤

瑞典無害，生性強健，病害很少，至於蟲害，一般爲害蔬菜的害蟲，有時也會發生，可用二十五% DDT或馬拉松防治。

根大如菜碗，重達二公斤以上，可開始收穫。如果延期放置田間陸續收穫，至翌春以後，不會抽苔，地上部葉榮三萬至四萬公斤左右。

種子直播後一百二十天，苗高和植一尺高，根
子直播後一百二十天，苗高和植一尺高，根

東林：起右，隊醫獸的國王亞匹索衣洲非東征派國我
(攝欣聯張)。祥志妻、俊雄邊、(長隊)獻滑馬、