



高雄六四號稻種
可能適合看天田

【問】：水稻高雄六十四號性質如何？適於南部「看天田」嗎？據說在抽穗結實期，遇雨易倒伏，是真的嗎？（高雄縣燕巢鄉橫山村深興路十六之三號馬守連）

【答】：高雄六十四號，近年來在高雄區第一、二期栽培面積逐漸增加中。這品種的分蘗和成熟期等均屬中等，品質優良，產量也高。第二期作可能適合看天田。整地法如同陸稻，並行條播。發芽後在水稻生育約四至五枚葉片時，除雨天外，儘量灌溉，以免發生立枯病，以後每隔七至十天一次，土壤水份經常保持百分之六十以上，不必照一

金蓮種子行

本行：員林鎮光明街十一號（菓菜市場前）
分行：永靖鄉永興路六十一號（永靖農會邊）
郵政劃撥儲中字一〇八四五號

新夏蔴35天包心白
中生40天包心白
潮洋一號目瓜
雙頭正齊大條刺瓜
純正栳型蕃茄子
優良頻型蕃茄子
改良矮性皇帝茄子
各種早熟晚熟蘿蔔
各種子包心白

新理想36天高梨菜子
新改良5085天高梨菜子
金澤結頭甘藍
其它國內外優良種子
在庫豐富備有目錄及生地黃栽培法函索即寄，各種包心白
菜子如需樣本試作請付八角郵資以便贈送。

般水稻積水，但在有效分蘗，幼穗形成期和抽穗期等，應分別多量灌水。至今尚未發現倒伏現象。（謝英鏗）

秧田一百五十坪
稻種要八十臺斤

【問】：一、二期稻，一甲地要多少斤稻種？
二、蓬萊、在來、一期、二期有何差別？
三、木田一甲秧田要幾坪？（彰化縣大村鄉美港村中山路十五號王新助）

【答】：一、一甲地需稻種八十至一百臺斤，如種子優良八十臺斤已足。
二、在來稻比蓬萊稻種子量略可減少，一期作比二期作氣候冷，發芽率較差，種子量需稍加。
三、本田一甲地，需秧田二百五十至一百八十坪為理想。（楊方平）

早熟糯稻
並無推廣

【問】：一、那種糯稻產量較高？
二、是否有早熟的糯稻品種推廣？（桃園縣新屋鄉平均村六十六號之一陳水源）

【答】：一、現在產量較高的糯稻是臺農八號和臺中糯四十六號，生長日數和臺中六十五號差不多，抗病性不強。種子可向臺北農業試驗所農場接洽。
二、目前為止，並無推廣用早熟糯糯稻。（楊方平）

旭牌植物生長促進劑

一切農作物增收聖劑

木オゲン

技術：日本旭化學株式會社
製造：新豐收化工廠
臺北市延平南路127號

農作物增收劑

木オゲン

綜合微量要素葉面噴布劑

木オゲン

クラウン化成株式會社

①防果實落
②預防落果
③健全發育
④提高收穫量
⑤增加產量
⑥促進生長
⑦增加葉綠素
⑧增加葉面積
⑨增加葉厚度
⑩增加葉壽命

日本農林省登錄生第1215號

臺灣總代理 豐裕農藥行
員林鎮民生路230號 電話583號

植物促進生育劑

效果確實 信用可靠

應供貨現

2571

總經理：**信承農產行**
溪湖鎮平和里員鹿路66號
電話 261 號

臺大高雄五號大豆 適於秋播產量較高

【問】：一、寒露前後至霜降前，播種大豆那一種最好？

二、臺大高雄五號六號和百美豆比較，那種油質多？

三、那種對氣候的敏感性較弱？（屏東縣竹田鄉西勢三十五號陳傳富）

【答】：一、大豆新品種，在寒露前後至霜降前播種，以臺大高雄五號產量較高，愛家豆次之，百美豆又次之。

二、臺大高雄五號、六號和百美豆的含油量大約都在百分之十七以上，據不同時期，不同地點的油份分析結果，臺大高雄五號、六號的含油量比百美豆為高。

三、臺大高雄五號對氣溫的感應性比較六號為弱，因此五號比較適合秋季播種，同時產量也比六號為穩定。（劉文慶）

東山番石榴

永靖售幼苗

【問】：栽培番石榴以何品種為宜，那裏有種苗出售？（雲林縣土庫鎮葉溪湖四號黃成德）

【答】：本省栽培番石榴以「東山月拔」和「廣東」兩品種適於平地栽培，「石汾」則適於山地栽培。土質以沙質壤土為最適宜。這三個品種的食味、香氣、丙種維生素的含量和產量，都很優良。幼苗在彰化縣永靖鄉苗圃繁殖很多。（張振甫）


秋播養生桃

冬至前嫁接

【問】：一、桃實生苗的繁殖法如何？時為宜？（花蓮縣瑞穗鄉瑞萬村二十一號蘇和清）

二、嫁接桃李何時為宜？

【答】：一、把現在收穫的桃種子，貯藏在乾沙內，十一月播種，次年一月，即可發芽。桃的種子



有硬殼，播種前要經過適當的處理，普通處理的方法有兩種：一是在播種前用清水浸種幾天再行播種。二是在播種前一個月，就是十月初，用濕沙層積貯藏，到十一月初舉行播種，種子發芽後，約經一年即可嫁接。

冬瓜九月後種

價值各有不同

【問】：一、現在想種冬瓜是否太晚？株行距各若干？

二、冬瓜發生病蟲害如何防治？

三、冬瓜和刺瓜是否相同？

四、冬瓜和刺瓜加工後的時價各若干？

國際市場是否穩固？（臺南縣善化鎮茄南里第一鄰五十六號唐金鑾）

【答】：一、臺南地區現在種冬瓜太遲，等九月以後種植為宜。行距三·五×一·五公尺。

二、在本葉展開後噴射一至二次大生七八的四倍液，如莖葉過於茂盛，易染白粉病，可改噴射「可利生」一千倍液。

三、冬瓜和刺瓜（胡瓜、黃瓜）不同，栽培方法相差很大。

四、冬瓜可作蜜餞，刺瓜可作醬菜，時價因地方不同，價格亦異，批發價和零售價又不同，至於國際市場是否穩固，也很難斷定。（王進生）

櫻桃蘿蔔

卅天可收

【問】：一、西洋小蘿蔔種子何處有賣？每分地需種子多少？

二、六月下旬可種植否？有無栽培價值？需何特殊技術？

三、每分地收量若干種植後幾天可收？



富粒松

低毒性強力殺蟲劑

請認明拜耳商標是
品質高超信用可靠之標記

臺灣總代理：中德貿易有限公司
臺北市博愛路九十八號

現貨供應處：興農化學工廠有限公司
臺中縣大里鄉內新路五十九號

最好的獸藥 最佳的效能 Veterinary Medicine




綜合素 強力治療用針劑

適應：豬、牛、馬、羊、狗及家禽傳染性、細菌性、化膿性、諸疾患。
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三八號

家禽的救星 效能如仙丹

禽聖片 A.C.M.



專家SITON博士提供配方
適應：家禽、鷄、鴨、鵝、鴿子等傳染性、細菌性、諸疾患、投藥方便。
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三六號

外銷東南亞自由國家
精美說明書備索 藥房飼料行有售
太平洋製藥有限公司
臺北市中山北路一段一〇五巷九〇號



四、五寸胡蘿蔔籽何處有賣？價格如何？（臺南縣下營鄉紅厝村六號顏新爵）

【答】：一、西洋小蘿蔔（櫻桃蘿蔔）的種子和價值可向臺北市迪化街臺灣農產企業公司洽購。每十公畝

需種子五公升。
二、西洋小蘿蔔宜在九月後播種，銷路不多，宜少種，六月裏種積可用遮蔭栽培。

三、播種後約二十五至三十天就可以收穫，每坪可收三至四公斤，栽培時，宜分批播種，每次約播十五坪，不要一次播太多。
四、五寸胡蘿蔔籽本省各地種子行都有，每磅約一百二十元。（于進生）

菜豆葉銹病

噴波爾多液

【問】：秋植豇豆常發生葉銹病，噴射大生七八的四百倍液防治又用富粒多一千倍液噴射都無效，應用何種藥劑為宜？（屏東縣內埔鄉豐田村新中路二十五號張忠富）

【答】：一、改用展着劑加入六斗式石灰波爾多液撒佈葉的兩面。
二、燒掉被害葉，並作堆肥，使它充分發酵。

三、富粒多是殺蟲藥，銹病不必用它。

苦桃可作砧木

梅荔不宜間作

【問】：一、改良梅樹嫁接用砧木，用苦桃樹會不會發育比較快？

二、用那一種砧木為宜？
三、梅和荔枝同植一園有害否？（臺中市民族路一四一號李俊騰）

【答】：一、梅樹嫁接，最好用在來種梅樹作砧木，但苦桃也行，發育可能無甚差異。

二、梅和荔枝壽命都很長，樹形亦均擴張，不宜間種在一個果園。果樹間植，不同樹種的壽命，必須差異很大。（張振宙）

落花生莖葉

可培養洋菇

【問】：一、落花生莖葉是否可以栽培洋菇的材料？

二、堆積發酵的方法如何？（南投鎮茄興里彭南路四十九號周見涼）

【答】：一、據本省中部，有一部份農家使用花生莖葉，自行試作堆肥，栽培洋菇的結果，大致可達到稻草堆肥的產量標準。

二、化學肥料的配合方法，據農家表示，可參照稻草的配合量。但堆積日數，需延長一禮拜。（胡開仁）

鱒魚吃動物性飼料

需要注意防逃設備

【問】：一、鱒魚的飼料和生殖如何？
二、養鱒魚的水池四周和池底是否須砌水泥？飼養鱒魚要注意那些事？（嘉義縣竹崎鄉鹿滿村麻笈浦四十一號劉興松）

【答】：一、鱒魚的飼料，是動物性餌料，如小雜魚、蚯蚓、蝦類等，生殖是卵生，產卵期是在天約二至四月，詳細情形正在研究中。

二、鱒魚的養殖池四周，一定要築成磚砌水泥，或水泥砌石才好。池底如果是硬土，不用水泥做也可以，但要加施較軟的泥土，成為土堆，供鱒魚棲息用。

三、應注意事項：(1)魚有大噴小的情形，放養時，最好放體型一般大的為宜。(2)鱒魚很容易逃走，所以灌排水門要特別做得完全。(3)給餌量要參酌索食的情形而定，過多時，池水變壞，影響鱒魚生活，甚至發生死亡。（劉嘉剛）

耕牛腹瀉

改善飼料

【問】：一、本人飼養一頭耕牛，吃了青草以後，糞便成水狀，是何原因？

二、如何改良和防止？（苗栗縣苑裡鎮上公里二鄰二十一號陳水金）



米賜多愛

METASYSTOXi

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥

原裝：1000CC, 2500CC 鋁瓶

多穗

T U Z E T

水稻紋枯病特效藥

原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

拜耳銅粉

(氧氯化銅水懸劑)

CUPRAVIT ob21

最新全能低毒性殺菌劑

原裝：1Kg 方鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易有限公司

臺北市天水路二之四號
電話：四三八〇三·四九六六三

現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四五二號
電話：二一九八

請認明拜耳商標是
品質高超信用可靠之標記



品藥源益

優良品質的標誌

長效股

最新持續性噴殺劑
注射一次藥效持續24小時

益源四環素

最新廣效抗生素
藥性安定藥效迅速

安彼灵

強心利尿解熱藥

氣胺素

豬肺炎腸炎下痢
強力強大藥效備具

益源製藥所出品
台北市羅斯福路三段二二三號

【答】：上述情形，可能是患營養性的腹瀉。防止法是在口糧中補充些米糠、甘薯簽和少許大豆餅。此外還應給些骨粉和食鹽。(李登元)

啤酒槽含蛋白質

可作為豬雞飼料

【問】：釀啤酒的酒精(啤酒渣)，有何養分？可作豬、牛、雞的飼料嗎？(臺北縣三重市大同南路八十二巷四號李進賢)

【答】：啤酒渣含蛋白質，乾的約含百分之廿三，濕的約含百分之四。可作豬、雞飼料，豬日糧中可配合至四分之一，雞的日糧，可配合十分之一至一·五。(李登元)

「飛納賽淨」和「牛豬安」

可防治牛羊豬的內寄生蟲

【問】：乳羊將生蟲驅除用藥品「飛納賽淨」フエノチアチン何處有售？(彰化市西芳里九號張宗哲)

【答】：「飛納賽淨」Phenothiazine (フエノチアチン) 是英國卜內門出品，現在臺灣有無進口不知道，是一磅一磅出售的，你可寫信到臺北國際家畜藥品公司去問。但是現在有一種西德拜耳出品的新藥，對牛、羊、豬等內寄生蟲都很有效，叫做「牛豬

安」Nepuron，是中德公司進口，臺南元山化學公司總經理，可零售，你可寫信到臺南復興路元山化學公司詢問。(黃立羣)

爬地藍卵葉藤陰多藤

適於北部柑園防沖刷

【問】：一、北部文山區傾斜山地的柑桔園，想種豆科植物，減少土壤流失。有那幾種？以那一種比較好？

二、何處出售優良的種子，價格如何？三、欲求綠肥作物，經年生長不斷，而且無須太多的勞力，應如何配合混植？(臺北縣永和鎮文化街九十四巷四號趙慶慶)

【答】：一、北部文山區柑桔園傾斜地種植多年生的豆科爬地藍、卵葉藤、陰多藤、野生大豆等四種較佳。除多藤和野生大豆除供作製綠肥用者外，尚可充作飼料。二、多年生豆科作物，初期生長緩慢，除草人工化費較多，需待四個月後，莖葉就蓋滿園地了。

三、爬地藍、卵葉藤、陰多藤等品種都用扦插繁殖，如需少量苗，可向臺北市公館農業試驗所農藝系洽取，野生大豆種子請向農林廳農產科洽購。(張國勤)

增加產量防止落花落果

綠培靈

旭牌植物增收聖劑

技術：日本旭化學株式會社
製造：新豐收化工廠
臺北市延平南路127號

最新驚人植物ホルモン劑出現了

請用 允多收 液劑

ウントニツク

政府 檢 驗
合 格 工 廠



農 藥



牌 方 圓

巴 拉 松 乳 劑
P M 乳 劑
馬 拉 松 乳 劑
安 特 靈 乳 劑
靈 丹 乳 劑



現 貨 供 應

保 證 效 能 能 靠
信 用 可 果 實
防 止 落 果 貴
促 進 產 量 成
增 加 產 量 收 成

桃園龜山 允發農化工廠有限公司 榮譽出品
營業處：臺北市西園路二段167號 電話：36549

尿 素

尿素肥效等於硫酸銨22倍
尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料

原氯化銨 還磷酸銨 磷酸銨鈣 化成銨磷

成份保證 肥效宏大



台灣肥料股份有限公司
台北市新橋路九十一號 電話：二五六一