

### 臺大高雄五號大豆 適於秋播產量較高

【問】：一、寒露前後至霜降前，播種大豆那一種最好？

二、臺大高雄五號六號和百美豆比較，那種油質多？

三、那種對氣候的敏感性較弱？（屏東縣竹田鄉西勢三十五號陳傳富）

【答】：一、大豆新品種，在寒露前後至霜降前播種，以臺大高雄五號產量較高，愛家豆次之，百美豆又次之。

二、臺大高雄五號、六號和百美豆的含油量大約都在百分之十七以上，據不同時期，不同地點的油份分析結果，臺大高雄五號、六號的含油量比百美豆為高。

三、臺大高雄五號對氣溫的感應性比較六號為弱，因此五號比較適合秋季播種，同時產量也比六號為穩定。（劉文慶）

### 東山番石榴

#### 永靖售幼苗

【問】：栽培番石榴以何品種為宜，那裏有種苗出售？（雲林縣土庫鎮葉溪湖四號黃成德）

【答】：本省栽培番石榴以「東山月拔」和「廣東」兩品種適於平地栽培，「石汾」則適於山地栽培。土質以沙質壤土為最適宜。這三個品種的食味、香氣、丙種維生素的含量和產量，都很優良。幼苗在彰化縣永靖鄉苗圃繁殖很多。（張振甫）


### 秋播養生桃

#### 冬至前嫁接

【問】：一、桃實生苗的繁殖法如何？

二、嫁接桃李何時為宜？（花蓮縣瑞穗鄉瑞萬村二十一號蘇和清）

【答】：一、把現在收穫的桃種子，貯藏在乾沙內，十一月播種，次年一月，即可發芽。桃的種子



有硬殼，播種前要經過適當的處理，普通處理的方法有兩種：一是在播種前用清水浸種幾天再行播種。二是在播種前一個月，就是十月初，用濕沙層積貯藏，到十一月初舉行播種，種子發芽後，約經一年即可嫁接。

二、桃李的嫁接方法，以切接比較普遍，切接在十二月冬至前後行之。次為芽接，在九至十月間行之。（張靜吾）

### 冬瓜九月後種

#### 價值各有不同

【問】：一、現在想種冬瓜是否太晚？株行距各若干？

二、冬瓜發生病蟲害如何防治？

三、冬瓜和刺瓜是否相同？

四、冬瓜和刺瓜加工後的時價各若干？

國際市場是否穩固？（臺南縣善化鎮茄南里第一鄰五十六號唐金鑾）

【答】：一、臺南地區現在種冬瓜太遲，等九月以後種植為宜。行距三·五×一·五公尺。

二、在本葉展開後噴射一至二次大生七八的四倍液，如莖葉過於茂盛，易染白粉病，可改噴射「可利生」一千倍液。

三、冬瓜和刺瓜（胡瓜、黃瓜）不同，栽培方法相差很大。

四、冬瓜可作蜜餞，刺瓜可作醬菜，時價因地方不同，價格亦異，批發價和零售價又不同，至於國際市場是否穩固，也很難斷定。（王進生）

### 櫻桃蘿蔔

#### 卅天可收

【問】：一、西洋小蘿蔔種子何處有賣？每分地需種子多少？

二、六月下旬可種植否？有無栽培價值？需何特殊技術？

三、每分地收量若干種植後幾天可收？



# 富粒松

## 低毒性強力殺蟲劑

請認明拜耳商標是  
品質高超信用可靠之標記

臺灣總代理：中德貿易有限公司  
臺北市博愛路九十八號  
現貨供應處：興農化學工廠有限公司  
臺中縣大里鄉內新路五十九號

## 最好的獸藥 最佳的效能 Veterinary Medicine



### 綜合素 強力治療用針劑

適應：豬、牛、馬、羊、狗及家禽傳染性、細菌性、化膿性、諸疾患。  
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三八號

### 家禽的救星 效能如仙丹

### 禽聖片 A.C.M.



專家SITON博士提供配方  
適應：家禽、鷄、鴨、鵝、鴿子等傳染性、細菌性、諸疾患、投藥方便。  
農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三六號  
外銷東南亞自由國家  
精美說明書備索 藥房飼料行有售  
太平洋製藥有限公司  
臺北市中山北路一段一〇五巷九〇號