

臺大高雄五號大豆 適於秋播產量較高

【問】：一、寒露前後至霜降前，播種大豆那一種最好？

二、臺大高雄五號六號和百美豆比較，那種油質多？

三、那種對氣候的敏感性較弱？（屏東縣竹田鄉西勢三十五號陳傳富）

【答】：一、大豆新品種，在寒露前後至霜降前播種，以臺大高雄五號產量較高，愛家豆次之，百美豆又次之。

二、臺大高雄五號、六號和百美豆的含油量大約都在百分之十七以上，據不同時期，不同地點的油份分析結果，臺大高雄五號、六號的含油量比百美豆為高。

三、臺大高雄五號對氣溫的感應性比較六號為弱，因此五號比較適合秋季播種，同時產量也比六號為穩定。（劉文慶）

東山番石榴

永靖售幼苗

【問】：栽培番石榴以何品種為宜，那裏有種苗出售？（雲林縣土庫鎮葉溪湖四號黃成德）

【答】：本省栽培番石榴以「東山月拔」和「廣東」兩品種適於平地栽培，「石汾」則適於山地栽培。土質以沙質壤土為最適宜。這三個品種的食味、香氣、丙種維生素的含量和產量，都很優良。幼苗在彰化縣永靖鄉苗圃繁殖很多。（張振甫）

秋播養生桃

冬至前嫁接

【問】：一、桃實生苗的繁殖法如何？

二、嫁接桃李何時為宜？（花蓮縣瑞穗鄉瑞萬村二十一號蘇和清）

【答】：一、把現在收穫的桃種子，貯藏在乾沙內，十一月播種，次年一月，即可發芽。桃的種子



有硬殼，播種前要經過適當的處理，普通處理的方法有兩種：一是在播種前用清水浸種幾天再行播種。二是在播種前一個月，就是十月初，用濕沙層積貯藏，到十一月初舉行播種，種子發芽後，約經一年即可嫁接。

二、桃李的嫁接方法，以切接比較普遍，切接在十二月冬至前後行之。次為芽接，在九至十月間行之。（張靜吾）

冬瓜九月後種

【問】：一、現在想種冬瓜是否太晚？株行距各若干？

二、冬瓜發生病蟲害如何防治？

三、冬瓜和刺瓜是否相同？

四、冬瓜和刺瓜加工後的時價各若干？國際市場是否穩固？（臺南縣善化鎮茄南里第一鄰五十六號唐金鑾）

【答】：一、臺南地區現在種冬瓜太遲，等九月以後種植為宜。行距三·五×一·五公尺。

二、在本葉展開後噴射一至二次大生七八的四倍液，如莖葉過於茂盛，易染白粉病，可改噴射「可利生」一千倍液。

三、冬瓜和刺瓜（胡瓜、黃瓜）不同，栽培方法相差很大。

四、冬瓜可作蜜餞，刺瓜可作醬菜，時價因地方不同，價格亦異，批發價和零售價又不同，至於國際市場是否穩固，也很難斷定。（王進生）


櫻桃蘿蔔

卅天可收

【問】：一、西洋小蘿蔔種子何處有賣？每分地需種子多少？

二、六月下旬可種植否？有無栽培價值？需何特殊技術？

三、每分地收量若干種植後幾天可收？



請認明拜耳商標是
品質高超信用可靠之標記

富粒松

低毒性強力殺蟲劑

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路九十八號

現貨供應處：興農化學工廠有限公司

臺中縣大里鄉內新路五十九號

最好的獸藥
最佳的效能

Veterinary Medicine



綜合素 強力治療用針劑

適應：豬、牛、馬、羊、狗及家禽傳染性、細菌性、化膿性、諸疾患。

農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三八號

家禽的救星
效能如仙丹

禽聖片 A.C.M.



專家SITON博士提供配方

適應：家禽、鷄、鴨、鵝、鴿子等傳染性、細菌性、諸疾患、投藥方便。

農林廳查驗合格農畜衛可字第〇三三六號

外銷東南亞自由國家

精美說明書備索 藥房飼料行有售

太平洋製藥有限公司

臺北市中山北路一段一〇五巷九〇號