

怎樣防治水稻二化螟蛾？

依必安 EPN 45% 乳劑是最可靠的特效藥!!

應隨時注意田間，若有螟蛾或卵塊發生，應於第一次除草後立即噴射45%依必安1,000倍~1,500倍稀釋液。每公頃用量800~1200公升。孕穗期（大壯期）如螟蛾繼續發生即繼續噴射依必安45%乳劑1,000倍稀釋液。每公頃用量1200~15000公升。

注意：將藥液充分噴射到稻莖及葉鞘部上必可收到最可靠的效果。

EPN 之優點：

- (1) 殺效性特優：一次噴藥效力維持二~三星期故使用EPN可減少噴藥次數，省錢省力。
- (2) 毒性較低：對人畜毒害約為巴拉松之五分之一。
- (3) 廣範圍的殺蟲效力：對於水稻的二化螟蟲、三化螟蟲、稻包蟲，果樹的紅蜘蛛、捲葉蟲、蚜蟲等都有強烈的殺蟲效力。
- (4) 化學性安定：除強鹼性藥劑外之殺菌或殺蟲劑皆可以混合使用，亦可與水銀劑混合同時使用以防治稻熱病及螟蟲。




1 依必安是防治水稻二化螟蟲、一點螟蛾最長效性而可靠之特效藥，請向各地農會、農藥店購買。



2 將所需藥量之依必安乳劑用注射器準確抽出，或倒入計量杯中量好。




3 將量好之依必安倒入一定量的水中並攪拌使之成為均勻的稀釋液。



4 將調配好的依必安稀釋液小心地倒入噴霧器內。



5 使用時必須穿妥清潔手套、長鞋、口罩、防毒衣等，順風向噴射。



6 注意把藥液充分地噴施在稻莖及葉鞘部上，必收可靠而滿意的效果。

美國杜邦公司工、農藥部

臺灣總代理：合裕貿易股份有限公司

臺北市中正路1199號

出品調配廠：新生農化廠股份有限公司

現貨供應處：興農化學工廠有限公司



REG. U.S. PAT.OFF.