


# ？死壓被麼什爲猪小 ？猪小咬麼什爲猪母



• 欣 聯 張 •

養豬的農友們，好不容易等到母猪分娩，眼看財富便要進門，可是遇到不幸時，小猪常常會被母猪壓死或咬死，引起很大的損失，但如能先瞭解它的原因，不要迷信而設法預防，就可以萬無一失了。

## 母猪大·乳猪弱·猪舍狹 ——小猪易被壓死——

母猪大，乳猪弱，猪舍狹，躺下地時，即使聽到小猪的叫聲，也無法立刻站起來，終於把小猪壓傷或壓死。

母猪哺乳時，大多橫臥在牆壁旁邊，這時在它身邊的小猪，如果無處可躲，或者來不及避開時，很容易被母猪壓死在下面。

剛出生的小猪，因為活力還不夠，或發育不好，也是容易被壓死的原因之一。

猪舍太狹，鋪的褥草太長，或是太厚，也可能使小猪因而被母猪壓死。預防的方法如次：

一、分娩猪舍的面積，要寬敞一點，至少要九公尺寬十二公尺長以上。  
二、褥草（稻草）切斷成二、三節，並且不要鋪得太厚。

三、分娩舍內，母猪常睡的地方，應架設保護欄，就是離開牆壁五寸，離地七寸處，橫放一支九木，當母猪橫臥時，可以讓小猪有路走開，避免被壓死。

## 太敏感·怕痛苦·太緊張 ——母猪會咬小猪——

太敏感，怕痛苦，太緊張，咬死小猪的現象。主要是因為母猪的過敏性。尤其是生第一胎的母猪，因為還沒有分娩的經驗，再加受了分娩前的陣痛，分娩時或難產時的掙扎和產後的痛苦，使神經過分的緊張。看到了沒有見過的小東西就咬。因此，不敢把小猪放下去哺乳。

但是小猪生下來在十小時內不給乳吃，大都會因衰弱餓死，所以應該趕快設法讓小猪吃乳。以下是各種處理的步驟：

猪舍裏的光線如果太強，用麻袋，草席等圍起來，使舍內光線暗一點，使母猪的精神可以緩和避免過分的緊張。

注射精神安定劑，例如冬眠寧等，可使母猪鎮靜下來。

產後的胎衣，尚未落下的，應該給母猪注射催胎針，使胎衣儘早落下，減少痛苦。

經過以上的處理，還不能使母猪讓小猪接近吸乳的時候，可以把母猪的腳和嘴用繩子捆起來，然後把小猪靠近母猪，使它親近後哺乳，就會很快的改正過來，不會再咬小猪了。


萬一，用了這些方法還是不能達到目的時，祇有設法尋找和它分娩期相近的其他母猪，把剩下的小猪去寄養。否則祇能實施人工哺乳來維持小猪的生命。

為了預防母猪會在分娩後咬死小猪，最好加強新母猪分娩前的管理，有兩種方法：

一、分娩猪舍，要保持清潔和通風。並設法使猪舍裏的光線很柔和。  
二、妊娠後半期，管理人多接近母猪，把猪體摸擦刷刷，讓母猪感覺有所依靠，增加安全感，可以減輕因為分娩而引起神經過分的緊張。

# 預防火災着會記！

中禾·文  
龔君·圖



，喜歡上（戲遊）道回（孩小）仔緊  
，戲，巴做火點榮大  
。（棄放）碟愛無間一層草

，技淫紙繁交友朋  
，時火起煮物火頭煙  
，（心小）字細愛小  
！鏡大了心小無

，滴幾無水雨平今  
，時爆乾萬萬心小  
！意注愛災火防