

A
BAYER
M
ER

牛猪安

『牛猪安』的應用範圍廣大，對下列動物所有寄生蟲均有卓效！

- | | |
|-----------|-------|
| Cows | 母牛 |
| Bulls | 牡牛 |
| Calves | 犊 |
| Sheep | 羊 |
| Lambs | 羔羊 |
| Rams | 闖去的公羊 |
| Mares | 牝馬、牝驢 |
| Stallions | 種牡馬 |
| Foals | 小馬、小驢 |
| Pigs | 猪 |
| Boars | 公猪 |
| Dogs | 犬 |
| Camels | 駱駝 |
| Poultry | 家禽 |
| Kid | 小山羊 |



動物用 牛 猪 安 原名 NEGUON 日名 ネグボン

「牛猪安」用法·用量

牛壁虱、毛虱……用100倍(牛猪安1加水100)或200倍稀釋水溶液洗擦尾根部或噴濕全身，及舍壁，容具等，經過五日再施行一次可完全驅除。

猪、羊毛虱……用100—200倍的稀釋水溶液洗擦或噴濕全身，經過一星期再噴洗一次即可完全驅除，用量猪2公升，羊1公升。

每頭成乳牛藥液使用量(稀釋液)為2—3公升。

猪疥癬病……使用50至100倍稀釋水溶液洗擦或噴射全身並舍舍牆壁每隔五日噴射一次至病狀痊癒為止，普通輕症者2—3次重症者3—4次即可痊癒，一頭成猪一次稀釋藥液約需0.5—1.0公升。除了噴藥以外可按體重每10公斤用牛猪安3公分的比例混合在飼料內給與，每隔3—4日投藥一次連續3—4次即可痊癒。

猪蛔蟲、鞭蟲……每10公斤體重用3公分牛猪安混合於飼料內給與可在48小時內把蛔蟲鞭蟲全部殺死，排出，同時也可以把腸結節蟲驅出。

狗毛囊蟲……使用1.0—2.0%藥液浸浴或洗擦，每隔二天施行一次至病狀痊癒為止，又每公斤體重口服0.2公分，每隔2—3天服藥一次連續3—4次即可。

牛的捻轉胃蟲毛樣線蟲……每百公斤體重用30公分，溶於200—1,000立方公分的水灌服，生長期的家畜如果每隔2—3個月給服一次對生長有益處。

家繩……用1.0%的牛猪安溶液噴射畜體及廐舍內外牆壁可以殺死聚集的家繩，刺繩，毒蛇等吸血昆蟲。

其他……牛猪安除以上害蟲外尚可以防治鷄虱，羽蟲及犬鞭蟲等，奏效甚速，安全可靠。

販賣 元山化學工業股份有限公司 (元子藥水舖)