

## 鳳梨園·甘蔗園·果樹園

### 怎樣使用「卡滅克斯」“KARMEX”除草劑

「卡滅克斯」為全世界有名的美國杜邦公司所出品，其主要成份為Diuron 80%之可濕性粉劑。業經臺灣省植物保護技術審護委員會列入推廣，使用於鳳梨園及甘蔗園之優良除草劑。

#### 使用「卡滅克斯」之優點：

- **高度的效果：**「卡滅克斯」除草劑對大部份禾本科雜草及闊葉類雜草均有極可靠之抑制效果，如牛筋草，馬唐草，野稗，狗牙根（線草），稜雙雀稗，埃及指梳茅，紅毛荳，白花覆香薷，紫花覆香薷，貓索牛，烏羅，野黃麻，灰菜，猪母菜，乳仔草，羊母乳，龍葵，炮仔草，酢醬草，紫酢醬草，刺蓼，大含羞草，小含羞草，薊苳，野葛，竹仔菜，三稜莎草，莎田草。
- **長期的藥效：**卡滅克斯為一可濕性粉劑，與水調合形成懸濁液，噴射於地上後，在土壤表層形成2—3吋之殺草層，長期繼續發揮功效，以抑制雜草之生長。
- **使用方法簡便，對作物安全：**卡滅克斯與水調合，充分攪拌即以噴霧器噴射於地面，依照指示使用，對人畜及作物均極安全，使卡滅克斯除草劑經營農場，確實方便，且可減少勞力及因操作而致之作物損害。
- **保持土壤肥力，促進作物生長，增加產量：**及時除草可免除土壤中肥料為雜草所吸收，因而減少肥料損失，促進作物生長進而提高產量及農友們的收入。

#### ※ 鳳梨園的除草方法：

新植鳳梨於種植後雜草未萌芽前第一次噴藥，以每公頃（實際噴射面積）3公斤之藥量調合水量500至700公升，充分攪拌後，均衡噴射於地面，翌年春初雨季前，再以每公頃2至3公斤之藥量（水500至700公升）作第二次噴藥，隔4個月後，再以每公頃2—3公斤（500至700公升）之藥量作第三次噴藥，如此可保持鳳梨園全期不生雜草。

#### ※ 甘蔗園的除草方法：


甘蔗種植後雜草未萌芽前，即以每公頃2公斤至3公斤之藥量與水500—700公升調合，充分攪拌，均衡噴射於地面（如土香較多之地可與2.4-D2公斤混合使用），如此噴藥一次即可保持良好效果，不需任何人工或機耕之操作。

#### ※ 柑桔園·香蕉園·果樹園的除草方法：

每公頃（實際噴射面積）以1.5—3公斤之藥量與水500—700公升調合，充分攪拌後，均衡噴射於地面，噴藥時期以春初雨季雜草未萌芽前，或將雜草清除後噴射一次，隔4個月後再噴射一次，即可保持一年不需人工除草。

#### ※ 使用上應注意事項：

- 使用前先將已生長之雜草清除，並將地面上之土塊，石頭清除後噴藥。
- 噴藥時噴霧器應時常攪拌和動搖，使藥液濃度保持均勻，並應注意盡量將藥液均衡噴射於土地表面。
- 卡滅克斯噴後，在上面有濕度時效果更加優良，故在雨季前施用最適宜。
- 噴藥後盡量避免鋤耕操作破壞土地表面，以免減低藥效。
- 如在24小時內有豪雨或颶風之可能時，不宜噴藥，以免藥劑流失，減少藥效。
- 卡滅克斯對所推薦之作物依照指示藥量及方法使用，對作物極安全，但請勿使用於所推薦以外之作物。
- 如要殺除已成長之雜草時，可添加杜邦公司出品之Surfactant w.k. 表面活性劑0.5%（藥液量之5/1000）混合使用以增強效果。



REG. U. S. PAT. OFF.

美國杜邦公司工·農藥部

臺灣總代理：合裕貿易股份有限公司

地址：臺北市中正路1199號

電話：48913