晚熟種日本燕麥	一三•五元
早熟多分蘖燕麥	一三元
黑麥草 意大利黑麥草	廿五元
多年生黑麥草	三十元
紅三葉草	五五元
苕子	四〇元
黑麥	九元

瑞典燕菁種子可向臺北市殖化街農產企業公司購買，每臺兩三十元，可育苗供一分地種植之用。埃及三葉草種子已由農復會經中信局向美國輸入，十一月中旬始能到達，將透過乳業改進會配售。

接種根瘤菌土

提高產量品質

豆科牧草根部，最好有根瘤菌共生。本文中所介紹的豆科牧草，在本地土壤中，都沒有適宜的在來根瘤菌品系，因此，在播種時，必須接種。

紫雲英的根瘤菌較爲普遍，但在未曾種植紫雲英的田區，必須向去年種植紫雲英並且生育良好的田區取土拌和種子，每公斤種子需用土壤二十公斤拌種。紅三葉草和苕子的根瘤菌系各有不同，已委託中興大學土壤肥料館製備，在十月上中旬可以經由乳業改進會供應。如不能取得接種劑，可向已種植有拉丁（白）三葉草的土地取土壤，供紅三葉草拌種用。苕菜的根瘤菌和蠶豆的相同。土壤和種子的比例都是二十比一。臺北附近種有三葉草可分取土壤的地點爲農試所農藝系特用作物室、鶯歌第一牧場，和埔心的味全牧場。

青刈放牧青貯

養牛並可養猪

冬季牧草可以青刈、放牧，並可製成青貯：

青刈 紫雲英莖長二臺尺以上時，可留一臺尺青刈。苕子也一樣。燕麥宜留三寸左右青刈。紅三葉草、黑麥草和黑麥可以距地面一寸刈取。瑞典燕菁當根直徑有五寸以上即可逐漸收穫每日所需的數量。

放牧 除瑞典燕菁外，其他各品種都可以放牧。放牧時，要分區輪流，避免過度放牧以利復生。

貯青 紫雲英、苕子、埃及三葉草和紅三葉草刈下後日曬六小時，再添加十分之一的甘藷簽，可製成香味良好的青貯料。瑞典燕菁可將葉片和根分開處理，肉質根製簽後日曬六小時，再混合十分之一的米糠，即可製造青貯。燕麥、黑麥、黑麥草三種，單獨或和豆科牧草如三葉草、苕子等混合，都可以製成良好的青貯料。

本文所介紹的冬季牧草，不論青草或青貯料，除養牛之外，並可作爲猪的青飼料，對於母猪尤爲有益。

各品種的全期產量，因土質、施肥、植期等因素而定。除瑞典燕菁外，各品種在五個月生長期中的生草產量，每公頃在三萬公斤左右。瑞典燕菁每公頃可收穫八萬公斤。

各位農友如在栽培、利用和種子供應方面有其他問題，請逕函臺北市南海路農復會畜牧組四一四室或電話臺北三七五四一轉分機一七六號詢問。

農友福音

利農自動送水機問者

不要人力，不要用電

不要用燃料

大陸林場用箋



利農股份有限公司

臺北市中山北路三段三四之一號二樓

電話：五二二七四