

嗎？對新植三個月的幼苗有無影響？（新竹市中山路二八一巷十三號黃炎章）

【答】：一、化學肥料可代人糞尿。氯化鈣（石灰素）應在金針菜定植前兩星期施用，每十公畝施四十五至七十五公斤。尿素宜於定植後十天施用，每十公畝約施三至四公斤。以後每個月一次就好，另須施用氯化鉀或草木灰等鉀肥為宜。

二、金針菜葉面有蠟質，葉面施肥時須加擦着劑。若生育很好，無須行葉面噴射，用量為十八公升水，加尿素七十至七十五公克就可。（王進生）

毛瓜着生都在子蔓

瓜蔓大繁茂可修剪

【問】：所種毛瓜現在已經長到六至九英尺，除了一株摘心的，已在子蔓四尺左右，着生兩個雌花外，其餘母蔓長到一丈高了，却不曾見到雌花，請問這是什麼原因？（嘉義縣民雄鄉山中村十三號賴政勝）

【答】：毛瓜的着果習性都在子蔓，雌花的着生節位，約在子蔓的三至八節上。



台端所栽毛瓜，雖然母蔓已長有一丈，但如子蔓尚未伸長時，即無法着生雌花，故需等待子蔓長大再觀察一下，決不會不着生雌花的。如瓜蔓過於茂盛，請適宜剪修，以利通風透光。（王進生）

促進小蒼蘭發芽


可用低溫來處理

【問】：一、六月間收種的小蒼蘭（素蘭）要使用一、二月間開花，請問種子要如何處理？

二、日本種的唐呂蒲（福蘭）收種起來後，爛得很利害約有三分之一，種後又爛了約三分之一，而同地種的臺灣種（撲達）却不會爛。日本種唐呂蒲要如何處理？如何消毒？用何藥品，才能使它收種後及種後後不會爛？（士林鎮公館里十五號葉寬）

【答】：一、要使小蒼蘭提前開花，可採用種球低溫處理法，把種球放入冷藏庫，保持溫度在攝氏四至六度間，經四十天以上，然後提前在八月間種植，可望在十二至一月間開花。但所開的花，不大也不多。

二、唐呂蒲爛爛是因為病害的關係。日本種抵抗力弱，罹病較多。



防治法：可把種球收穫後，馬上用「馬斯普龍」消毒，使用濃度是加水七百倍，浸漬二十分鐘，浸漬後陰乾，然後放在陰涼乾燥通風良好的地方貯藏，貯藏時不要堆積太厚。（誠靜吾）

水蜜桃在本省

尚在試驗栽培

【問】：一、水蜜桃原產何處，種類有幾種？何處有苗木出售？

二、水蜜桃適合何種土壤和氣候？

三、水蜜桃移植本省，在本省移植的第二代是否會變種？

四、水蜜桃在本省有無推廣計劃？（臺北縣坪林鄉坪林村四十四號林增德）

【答】：一、水蜜桃原產中國大陸，分南北兩大系統。北方系統，喜乾燥稍冷氣候，南方系統能耐熱與濕。適應本省的品種，正在試驗中，目前尚無苗木出售。

二、水蜜桃適於排水良好的砂壤土，在臺北縣也須需要在五百公尺以上的地區生產才好。

三、水蜜桃移植本省後，嫁接第二代不會變種，僅因氣候不宜，可能發育和結果受影響，並非它本身發生變異。

四、水蜜桃在本省山地，已由中興大學和山地農牧局在推廣中。（朱長志）

農葯成份標準 保證品質優良

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 總經銷處：
臺北：新泰興藥行 | 臺北市迪化街二段249號
電話：46732 52660 |
| 臺北：集祥行 | 臺北市遠東街47號
電話：30879 |
| 桃園：豐年農藥行 | 桃園縣中壢鎮民權路34號
電話：321號 |
| 新竹：新竹青果藥行 | 新竹市內大路105號
電話：1425 |
| 苗栗：順興行 | 竹南鎮八通街45號 |
| 臺中：通源行 | 臺中市同上路一段五號 電話：6227 |
| 臺中：國泰藥業行 | 臺中市中山路13號
電話：4384 |
| 南投：泰生保苗室 | 南投縣南投鎮民族路113號
電話：22號 |
| 彰化：美豐行 | 臺中市新華路327號
電話：363號 |
| 彰化：德榮行 | 彰化市新華里民生路166號
電話：401 |
| 鹿港：德豐行 | 臺中市同上路一段五號
電話：6227 |
| 雲林：德榮行 | 彰化市新華里民生路166號
電話：401 |
| 嘉義：一年豐藥業行 | 嘉義縣義竹鄉六柱村3鄰199號
電話：鹽水17之1 |
| 臺南：德榮藥業資材行 | 臺南市公館路173號
電話：3497號 |
| 高雄：富農藥行 | 臺南市中正路180號
電話：21069 |
| 花蓮：邱協成藥行 | 花蓮市中山路8號（彰化銀行對面） 電話：136 |
| 宜蘭：日豐肥料行 | 宜蘭市吳沙路49號 |
| 屏東：恆成行 | 屏東市民生路240號 |



巴拉松乳劑
PM乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DT乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

現貨供應

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣美芝路中正路三一七號