


農友經驗

臺南白油豆六號花生

每公頃淨收一萬九千多

今年春作，我大量栽培白油豆六號花生，經過如下：

一、牛犁翻二次，刈把耙一次。
 二、選擇優良飽滿的種子。三、每公頃施堆肥一萬三千公斤，硫酸銨四十公斤，過磷酸石灰一百五十公斤，氯化鉀一百公斤。四、行距一尺，株距三寸，每株一粒。若是株間五寸，播種兩粒。五、播種後二十餘天首次除草，隔三十多天，除第二次，灌溉後再培土一次。六、今年雖然受了嚴重的旱災，但是每公頃所收乾燥的落花生仍有三千四百二十六公斤，值二萬五千九百六十五元，淨收益一萬九千九百七十五元。（雲林縣四湖鄉施湖村下湖五號蔡仁吉）




左農吉仁蔡

中秋前後出菰筍

一月上旬先育苗

菰筍(茭白筍)適於有機質多的土壤。一月中旬開始育苗。方法是挖起往年粗大而優良的母株頭，經過幾十天的風化使它充分和陽光接觸，可以增強幼芽對於病蟲害的抵抗力。幼苗約在一公尺以上，一公尺半

以下，就可選擇優良的苗株，開始移植。行株距都是一公尺。栽種後的水深，保持約一點五至二公分，以免雜草叢生。一個月後，行第一次中耕除草，並施過肥硫酸銨，促進生長。四個月後行第二次中耕除草，順便去枯葉以利幼芽的有效分蘖。



母猪吃海帶可預防難產

母猪難產，對農友的損失不少，雖然有各種預防的方法，但是難免仍舊會遇到，而且一般農友飼養頭數越多，發生的機會也隨着增加。

這裏介紹一個比較簡單而有效的預防方法，就是在母猪懷胎期間，給與海帶一、二盞斤，就可避免難產。用法是每天約給二十公分長的海帶，浸水一小時後，給母猪吃，如果有不喜歡吃的，可以先切細，混合在飼料裏餵它，也會習慣的。（苗栗縣卓蘭鎮老庄里四號蔡益昆）


更正：十三卷十九期三頁清河種子行書據儲金嘉字八〇〇三三號誤植為八〇三〇七號予以更正。

農友們的福音!!
 適合秋季栽種的蔬菜優良品種保證農民滿意的收穫

歷有二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，清河種子行的新改良各種優良品種。味感良品種。●二號早中生35天黑葉包心白菜子，下種期：農曆六月下旬！九月下旬止，株距一尺五寸，每粒三斤至四斤。



黑葉天五十三生中早號二白心包



條母選荷蘿早頭



荷蘿早配交



頭菜花梅大良改



頭菜春州畔南

新品種晚生花菜子
 中生早70天長葉花椰菜子
 長岡交配一號甘藍菜子
 三池中生甘藍菜子
 金澤相蘭結頭菜子
 正北京劍刺頭菜子
 美國大五寸心參子(胡蘿蔔)
 美國加州大粒甜椒子
 紅仁白格二尺半長菜豆子
 鳥山扁圓型豆仔薯種子(刈薯)
 60天赤黑葉晚生包心白菜子
 長岡交配理想結球白菜子
 日本福壽二號トマト子
 日本高農福壽(三)號トマト子
 日本高農八號トマト子
 馬娜里トマト子
 蘋果型トマト子
 正鳥枝麻芝長茄子
 交配種長身早菜頭子
 頭州早60天長身菜頭子
 日本長岡交配60天結球白菜子
 正晚生長葉花菜子
 日本長岡交配干將結球白菜子
 中生晚80天純大白花椰菜子
 早生50天鳳山短種菜頭子
 正天字梅花春菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子
 臺大五號大豆子
 二四二矮性皇南豆子
 臺中九號紅花荷調豆子
 和美產白花荷調豆子

行子種河清 義嘉

號二八四路正中市義嘉
 號四八五三話電
 號七三〇〇八字嘉金儲撥