


農友經驗

臺南白油豆六號花生

每公頃淨收一萬九千多

今年春作，我大量栽培白油豆六號花生，經過如下：

一、牛犁翻二次，刈把耙一次。
 二、選擇優良飽滿的種子。三、每公頃施堆肥一萬三千公斤，硫酸銨四十公斤，過磷酸石灰一百五十公斤，氯化鉀一百公斤。四、行距一尺，株距三寸，每株一粒。若是株間五寸，播種兩粒。五、播種後二十餘天首次除草，隔三十多天，除第二次，灌溉後再培土一次。六、今年雖然受了嚴重的旱災，但是每公頃所收乾燥的落花生仍有三千四百二十六公斤，值二萬五千九百六十五元，淨收益一萬九千九百七十五元。（雲林縣四湖鄉施湖村下湖五號蔡仁吉）



左農吉仁蔡

中秋前後出菰筍


一月上旬先育苗

菰筍(茭白筍)適於有機質多的土壤。一月中旬開始育苗。方法是挖起往年粗大而優良的母株頭，經過幾十天的風化使它充分和陽光接觸，可以增強幼芽對於病蟲害的抵抗力。

幼苗約在一公尺以上，一公尺半

以下，就可選擇優良的苗株，開始移植。行株距都是一公尺

栽種後的水深，保持約一點五至二公分，以免雜草叢生。一個月後，行第一次中耕除草，並施過肥硫酸銨，促進生長。四個月後行第二次中耕除草，順便去枯葉以利幼芽的有效分蘖。



母猪吃海帶可預防難產

母猪難產，對農友的損失不少，雖然有各種預防的方法，但是難免仍舊會遇到，而且一般農友飼養頭數越多，發生的機會也隨着增加。

這裏介紹一個比較簡單而有效的預防方法，就是在母猪懷胎期間，給與海帶一、二盞斤，就可避免難產。用法是每天約給二十公分長的海帶，浸水一小時後，給母猪吃，如果有不喜歡吃的，可以先切細，混合在飼料裏餵它，也會習慣的。（苗栗縣卓蘭鎮老庄里四號蔡益昆）


更正：十三卷十九期三頁清河種子行書據儲金嘉字八〇〇三
 七號誤植為八〇三〇七號予以更正。

農友們的福音!!
 適合秋季栽植的蔬菜優良品種保證農民滿意的收穫

歷有二代七十餘年之經驗蔬榮種子專家，清河種子行的新改良各種優良品種。味感良品種。●二號早中生35天黑葉包心白菜子，下種期：農曆六月下旬！九月下旬止，株距一尺五寸，每粒三斤至四斤。



葉黑天五十三生中早號二白心包



條母選荷蘿早頭



荷蘿早配交



頭菜花梅大良改



頭菜春州畔南

新品種晚生花菜子
 中生早70天長葉花椰菜子
 長岡交配一號甘藍菜子
 三池中生甘藍菜子
 金澤相蘭結頭菜子
 正北京劍刺頭菜子
 美國大五寸心參子(胡蘿蔔)
 美國加州大粒甜椒子
 紅仁白格二尺半長菜豆子
 鳥山扁圓型豆仔薯種子(刈薯)
 子應有盡有，及其他特效農藥及東和牌噴霧器等，歡迎光臨賜顧。敝行未刊載種子應有盡有，及其他特效農藥及東和牌噴霧器等，歡迎光臨賜顧。

60天赤黑葉晚生包心白菜子
 長岡交配理想結球白菜子
 日本福壽二號トマト子
 日本高農福壽(三)號トマト子
 日本高農八號トマト子
 馬娜里トマト子
 蘋果型トマト子
 正鳥枝麻芝長茄子
 交配種長身早菜頭子
 頭州早60天長身菜頭子
 日本長岡交配60天結球白菜子
 正晚生長葉花菜子
 日本長岡交配干將結球白菜子
 中生晚80天純大白花椰菜子
 早生50天鳳山短種菜頭子
 正天字梅花春菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子
 臺大五號大豆子
 二四二矮性皇南豆子
 臺中九號紅花荷調豆子
 和美產白花荷調豆子

行子種河清 義嘉

號二八四路正中市義嘉
 號四八五三話電
 號七三〇〇八字嘉金儲撥