

家兔飼養小知識

·訓登陳·

利用農閑，飼養家兔，是一項簡單又經濟的副業，這裏告訴你有關母兔的飼料，兔仔的照顧和兔子病了治療的方法。

母兔的飼料配合

飼養母兔每天給飼料三次或早晚兩次，在夏天的基本飼料是青草類，冬天則以乾草和根菜類為主，此外要加濃厚飼料，包括穀物百分之五十，其餘是麩皮和糠類。成兔每頭每天需三十至五十公分。

雌兔的飼料按照上列配合以外，再加魚粉，或豆餅粉百分之二十至三十。哺乳兔，除了要餵嫩的青草外，再增加一半至一倍的濃厚飼料較妥。

雌兔經檢查確實後，要在預定分娩日期四、五天前，給與青草或乾草和淨水。產箱前面用草袋遮掩，夏天注意通風，冷天要能擋風，產後十天產箱要清潔消毒。

母兔分娩，不需要人幫助，約經一小時就可分娩完畢，每胎約有五、六頭。

照顧仔兔的方法

母兔分娩後三、四天，可以檢查仔兔數，把死的除去，這時不可以使母兔興奮，如有需要分離母仔的，先把仔兔，拿出箱外，此時往往因為人的臭味附着在仔兔身上，再放下時可能會被母兔咬死，因此抓仔兔的人要用手袋，或者預先把母兔的糞尿或敷藥塗擦在手上，然後方能把仔兔移動。

仔兔最初裸體，經兩週就開眼而發生初毛，三週就會走跳和自己找食料。

仔兔離乳要依發育的情形而定，大約經過三十五至四十五天。離乳時，最好是把母兔移出箱外，仔兔仍舊留在箱內。

仔兔的飼料，大體和母兔相似，但需切細粉碎後再餵，飼料給與量，在二個月以上，每頭每天是母兔飼量的五分之二，四個月內是五分之三，五個月內是五分之四，五個月以後可以成兔的飼料相同。


家兔疾病的治療

飼養家兔，平常注意健康，養成它的抵抗力，飼養的場所，在一年之中，要大消毒一、二次，注重衛生，一般的消毒液，以百分之二至三的來蘇液為宜。一旦有疾病，須早期隔離治療，如是傳染病，必須隨即消毒。

家兔一般常有的疾病，有下列四種：
一、惡性鼻加答兒——死亡率很高，發病初期用抗生素和磺胺劑，抗過敏性針等可望有助。

二、球蟲病——在離乳前後發生較多，下痢，便血，短期內即死亡。可用磺胺劑，抗生素類等治療。

三、微毒——死亡率很低，但傳染性強，可用人用的六〇六號溶解後，在耳靜脈注射一次就可痊癒，體重一公斤用〇・二至〇・三公分，成藥有兩種都有效：日本三共製藥出品：ネオア九サミノール，日本第一製藥出品ネオネオアセミン。



飯店衛生着注意？

龔君文

，鼻擦又尿放(司廚)夫司
；味一加手洗去無
，去落跌仔蚊神戶
。比會吃客人管嗽

，去落坐內入客人
；壞桌滿發油(埃塵)粉土斯
，椅桌擦伊共衫斯
！死半氣先就吃未

，(經烹)理料好店飯頂狀
，味好又吃好菜飯
，意注無生衛是但
！做有真願主客人