



F一五二甘蔗 栽培環境有限

【問】：F一五二甘蔗何處有出售？
 (花蓮縣瑞穗鄉六興村第十八號林萬成)
 【答】：一、F一五二甘蔗新品種需特別肥沃又有充足灌溉水的土地，才有好收量，宿根成熟又特別不好，在東部僅有臺東糖廠馬蘭農場試驗成績較好，如希得到少量種苗試種，可向該廠農務課商量。
 二、在花蓮糖廠範圍內的地區，較好的土地，以種植F一五一和F一四六較為安全。該廠有此蔗苗。(朱德琳)

生地苗每株一至三角 每分地可收千三百斤

【問】：一、純正川種生地苗，每株多少錢？二、每株多長標準？三、每分地須栽多少株？四、定植後多久可採收？五、每分地收益若干？(嘉義縣朴子鎮雙溪里二七號侯成良)
 【答】：一、生地苗每株一至三角，視品種純度而定。
 二、每株二至三寸高，也亦有賣種根的好，種根長約二寸。
 三、每分地須五千株苗，或種根六十至九十莖斤。
 四、六月定植，十一月起割至年三月止之間採收。
 五、每莖斤時價較昂昂三十元，每分地在日本可收一千至二千三百莖斤之間。(楊永裕)

【問】：一、中藥三七有幾個品種？標高一千四百至一千六百公尺可種植嗎？
 二、前述環境，可種其他中藥嗎？
 三、栽培中藥和加工法有何參考書？(花蓮橫貫公路華嚴溪陸嘉瑞)

中藥三七 謹防假冒

【答】：一、三七是菊科植物，洪三七(如川三七，俗稱川七)，是五茄科植物(如人參即為五茄科)川七市價很高，但本省目前都用單子葉植物的「其蓮」騙人上當，其形如紅竹。三七、川七都是雙子葉植物。
 二、可種貝母、防風、柴胡、當歸、白芷、山藥等。
 三、臺北市衡陽路大陸書局有日文參考書「わがらの藥草栽培」。(楊永裕)

栽培木耳 重在管理


【問】：一、栽培木耳有五十天，部份尚未發生幼耳，為什麼原因？
 二、木耳原木，部份被蛀可預預防？
 三、可否用井水噴或漂白粉消毒？對菌種有無妨害？
 四、採收木耳方法要用什麼工具？
 五、木耳原木的壽命有多久？
 六、用軟膠管直接撒自來水，壓力大，有無妨害？(臺南縣東山鄉嶺南村陳萬得)

【答】：一、根據一般情形，木耳晚生的原因如次：(一)樹木種類和樹齡不好，(二)菌種不好，(三)管理不同，(四)發生病蟲害。




農友們的福音!! 適合秋季栽植的蔬菜優良品種保證農民滿意的收穫

歷有二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，清河種子行的新改良各味優良品種。



條母選高羅早州頭



(菜白心包) 菜白球結生晚中葉赤



頭菜花梅大良改




頭菜春州畔南

新產品種晚生花菜子
 長岡交配一號甘藍菜子
 三池中生甘藍菜子
 金澤粗蘭結頭菜子
 正北京交配結頭菜子
 美國大五寸人參子(胡蘿蔔)
 美國原封裝球型洋蔥種子
 美國加州大粒甜椒子
 牛若丸莖菜子
 紅仁白格二尺半長菜子
 山扁圓型豆仔薯種子(刈薯)
 60天赤黑晚生包心白菜子
 長岡交配理想結球白菜子
 日本福壽二號トマト子
 馬娜里トマト子
 蘋果型トマト子
 正鳥枝麻芝長茄子
 頭州早80天長結球白菜
 日本長岡交配60天結球白菜
 正晚生長葉花菜子
 日本長岡交配王將結球白菜
 長岡交配二號白菜
 泰國鳳尾甲芥菜子
 龍野川牛蒡子
 新改良蘇魯種矮脚木瓜子
 新生50天鳳山短種菜頭子
 正天字梅花春菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子
 二四二矮性皇帝茄子
 臺中九號紅花荷蘭豆
 和美產白荷花蘭豆
 媽羅露トマト子
 正晚生花菜子
 長岡交配二號白菜子
 長岡交配二號白菜子
 新改良蘇魯種矮脚木瓜子
 新生50天鳳山短種菜頭子
 正天字梅花春菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子
 二四二矮性皇帝茄子
 臺中九號紅花荷蘭豆
 和美產白荷花蘭豆
 媽羅露トマト子
 正晚生花菜子
 長岡交配二號白菜子
 長岡交配二號白菜子
 新改良蘇魯種矮脚木瓜子
 新生50天鳳山短種菜頭子
 正天字梅花春菜頭子
 清河改良大梅花菜頭子
 阿里山美濃大根菜頭子

義嘉 清河種子行

嘉電劃 義話撥 市中三 正四五 路八〇〇 八四四 八四四 號七三



柑橘可貯藏五個月
注意保持溫度濕度

【問】：冷藏柑橘，適宜何種濕度和溫度？可藏多久？（嘉義縣水上鄉三昇村）

三、有關花卉參考書籍，中文本不多，日文參考書可向臺北市衡陽街七十九號大陸書店函索圖書目錄。（謝靜香）

二、木耳段木發現蛀蟲，如蛀淺淺，可以鐵絲刺殺或鉤出，如蛀深，可不必修治，以免有礙壽。

三、井水加千分之一五漂白粉，對木耳菌種發育無妨礙。並可防治部份有害菌類的發生。

四、採收木耳在基部用剪刀剪取，切勿傷及段木和周圍幼木。

五、栽植木耳段木的壽命隨樹木種類、大小、管理方法，而有差異，普通樹木較硬粗大的，發生木耳長久，反之則短。

六、自來水壓力大，不可接用軟膠管直接接撒水在木耳上，可在軟膠管上裝一噴霧器頭，以免傷害幼小木耳。（胡開仁）

玫瑰宜用高壓繁殖
唐菖蒲要排水良好

【問】：一、玫瑰用插枝法會變種嗎？用什麼方法最易繁殖？

二、怎樣種唐菖蒲才不會使種子腐爛？

三、請介紹有關花卉的書籍。（臺北縣內湖鄉港墘村八號林英俊）

【答】：一、玫瑰用高壓（或稱空中壓條）繁殖法最易成活，用插枝法繁殖，不會發生變種。

二、排水不良或容易積水的地方，種植唐菖蒲，種球較易腐爛。所以要選擇排水良好，土質疏鬆，或多施有機肥料時，可以減少種球腐爛。種球很大，需要切開時，傷口最好塗抹硫磺粉，並待傷口陰乾後再行種植，亦會減少種球的腐爛。

一四九號張維嶽

【答】：貯藏柑桔，冷藏庫以攝氏三至五度為最佳，一般貯藏庫，須保持攝氏五至八度。濕度以百分之八十至八十五為理想，因濕度過低時，易減輕果重，而濕度過高時則腐爛率提高。所以貯藏庫須注意換氣，防止因果實呼吸而引起過高的濕度。

貯藏期間視品種、採收期而成熟度而定，一般約三至五個月，貯藏愈久，出庫後腐爛愈速。（翁仁祿）

蓮霧傷根生長緩慢
果樹施肥都要稀釋

【問】：一、蓮霧常澆豬尿，生長緩慢是何故？

二、最好施用何種肥料？

三、栽種後幾年可結果？

四、種在刺竹旁一丈處影響生長否？（彰化縣埤頭鄉竹園村竹園路六十號吳朝印）

【答】：一、蓮霧通常是用扦插繁殖，按苗時根多受傷，是初年生長緩慢的重要原因。待根系發育正常後，如土壤條件適宜，或不缺肥料，生長常很旺盛。又種植成活後祇可施少量或稀薄肥料，施用豬尿時必須加水稀釋，濃厚的肥料當可阻碍根系發育，影響生長。

二、果樹種植成活後，如欲促進生長，可用一百至二百倍硫酸水或二百至四百倍尿素水，每月施用一、二次。兩三個月後，生長即可加速。稀薄的豬尿也是好肥料。

三、蓮霧種植後如生長正常，在第三年可以開花結果。

四、凡果樹種在竹類附近均難免受其影響，可在兩者中間挖溝深溝，隔斷竹鞭蔓延；可避免或減少地下部份的影響。至於樹冠部份，應經常將過高的竹幹或竹枝予以修剪，使陽光不受阻碍，方屬適宜。（張振甫）




正豐農藥

為第二期作大豐收貢獻

防治水稻一般病蟲害

- 劑劑劑劑劑劑劑劑
- 乳乳乳乳乳乳乳乳
- 松松松松松松松松
- 拉拉拉拉拉拉拉拉
- 巴拉巴拉巴拉巴拉
- 巴美馬P靈
- 劑劑劑劑劑劑劑劑
- 粉粉粉粉粉粉粉粉
- 寶寶寶寶寶寶寶寶
- 銅銅銅銅銅銅銅銅
- 綠綠綠綠綠綠綠綠



防治·水稻二化螟蟲

蔬菜青蟲，魚塭紅筋蟲
低毒性強力殺蟲劑
Dipterex s.p.80

地特松水溶粉劑

防治·水稻二化螟蟲及一般
害蟲柑桔果樹，蔬菜
一般害蟲

力拔山乳劑

低毒性
效驗

正豐化學股份有限公司
臺中縣 霧峯 電話63號



甜橙品種盧金剛

冷藏可延到六月



【問】：一、甜橙類中的「盧緊實」和「盧金剛」是否相同。

二、要怎樣設法使它到六月才採收？(臺中縣東勢鎮上城里二一七號張添勳)

【答】：一、由農復會

從美國加州引進的優良甜橙品種「Cute Gem (Gard)」，在本省普遍採用的譯名是「盧金剛」，所謂「盧緊實」可能就是指這品種。

二、「盧金剛」在本省試種結果，最晚採收時期是國曆四月下旬，五月以後即略呈回青現象，所以在樹上不能保持到六月。如果採收後貯藏在冷藏庫，即可維持到六月間。(翁仁祿)

西瓜一甲地種子牛兩

每分地可種二百多棵

【問】：一、栽培一甲地西瓜需種子若干？多少錢？那一品種較好？

二、行株距各若干？每分地種幾株？

三、利用抽水灌溉要怎樣做畦，須要全而灌溉嗎？

四、市面有無栽培西瓜書籍？(臺南縣左鎮鄉陸光村七十三號林登源)

【答】：一、種一甲地西瓜需半壘兩至一壘兩種子。每壘兩有八百至一千粒種子，每壘兩需種子二十五元，富光或富寶四十五元。

二、四方植時行株距各為七臺尺，如灌溉方便，可用畦溝旁單向條行植，行距二十臺尺，株距五臺尺。每分地可種二百至二百二十株。

三、西瓜灌水，以畦溝灌水和澆水法(砂土)為宜。

四、市面現無臺灣出版的西瓜書籍，可參閱本刊或向新竹青果合作社洽贈西瓜栽培手冊。(邱阿昌)

農林一號馬鈴薯

適於高雄區冬作

【問】：一、高雄縣路竹鄉適合種植北海道種馬鈴薯嗎？

二、可否代買種薯嗎？

三、每分地要種薯多少？(高雄縣路竹鄉社西村三一三號李炳森)

【答】：一、臺灣所栽北海道種馬鈴薯即「農林一號」冬作十二月播種，二月採收，適於路竹鄉。氣候過早或過遲，易徒長而不結馬鈴薯，請特別注意。

二、要買農林一號種薯，可請臺北市公館農業試驗所代為介紹，府上交貨，運到貨車可通之處，每壘斤包括運費共三元。

三、每分地需種薯一百四十臺斤。

四、高雄地區的鳳山試驗所，曾試種馬鈴薯成績很好，但必須冬作，如秋作和春作，則因氣溫太高不適栽培。(李伯年)

【問】：一、腰豆種子何處出售？

二、本省中部地區適合栽培否？何時下種為宜？

三、如何施肥？適合何種土壤？

四、下種後要多久能收穫？(臺中縣烏日鄉中山路八十七之三號陳如榮)

【答】：一、「腰豆」是熱帶果樹「藥果」的果實仁，原產印度，溫度愈高愈好。目前市面尚無種子出售，少量可向嘉義蘭藝試驗所索贈。

二、藥果不耐寒，如遇下霜，要審定重，例如今年二月間霜害，使臺北區農業改良場所育成的藥果苗，全部枯死。

三、臺中坡地栽培似無經濟價值。

四、定植後約六、七年才可收穫。(王進生)



農友先生們!!要多收洋菇產量 請用

「鬆育樂」 Soiluck 土壤改良劑!!

農友先生們! 洋菇已下種了，大家準備覆土了!! 請大家注意! 覆土是洋菇的生命線改良覆土的土質可增加產量及提高品質。要覆土請用「鬆育樂」土壤改良劑!!

特性：

- A 使土壤中的空氣流通良好。
- B 使水份的滲透性及排水性良好。
- C 使使其可容水性而保存適量水分。
- D 保全土壤鬆化至洋菇收完時不變。
- E 可耐寒耐濕，且可減少週期性的損失。

效果：

- A 可增加產量3~5成以上。
- B 可提高品質，增加收益。



鬆育樂 Soiluck SOIL CONDITIONER

用途：1. 洋菇之採種及栽培 2. 各種藥用植物之栽培 3. 各種藥用植物之土壤改良 4. 代替堆肥作專性土壤改良

製造元：日本信越化學工業株式會社 總代理店：三井物產株式會社 臺灣總經銷：信德貿易股份有限公司

製造元：日本·信越化學工業株式會社 總代理：日本·三井物產株式會社 臺灣總經銷：信德貿易股份有限公司

臺北市中山北路二段九六巷四一號之六 電話：42906號

實驗報告 函索即寄

大優贈送：

一、凡購五〇瓦裝二〇小包或壹公斤裝一包者，贈送洋衫壹件，多購多贈。二、送贈期間：即日起至本年十二月底止。

