

柑橘可貯藏五個月
注意保持溫度濕度

【問】：冷藏柑桔，適宜何種濕度和溫度？可藏多久？（嘉義縣水上鄉三昇村）

三、有關花卉參考書籍，中文本不多，日文參考書可向臺北市衡陽街七十九號大陸書店函索圖書目錄。（謝靜香）

二、木耳段木發現蛀蟲，如蛀淺淺，可以鐵絲刺殺或鉤出，如蛀深，可不必防治，以免有礙毒。

三、井水加千分之一五漂白粉，對木耳菌種發育無妨礙。並可防治部份有害菌類的發生。

四、採收木耳在基部用剪刀剪取，切勿傷及段木和周圍幼木。

五、栽植木耳段木的壽命隨樹木種類、大小、管理方法，而有差異，普通樹木較硬粗大的，發生木耳長久，反之則短。

六、自來水壓力大，不可接用軟膠管直接撒水在木耳上，可在軟膠管上裝一噴霧器頭，以免傷害幼小木耳。（胡開仁）

玫瑰宜用高壓繁殖
唐菖蒲要排水良好

【問】：一、玫瑰用插枝法會變種嗎？用什麼方法最易繁殖？

二、怎樣種唐菖蒲才不會使種子腐爛？

三、請介紹有關花卉的書籍。（臺北縣內湖鄉港墘村八號林英俊）

【答】：一、玫瑰用高壓（或稱空中壓條）繁殖法最易成活，用插枝法繁殖，不會發生變種。

二、排水不良或容易積水的地方，種植唐菖蒲，種球較易腐爛。所以要選擇排水良好，土質疏鬆，或多施有機肥料時，可以減少種球腐爛。種球很大，需要切開時，傷口最好塗抹硫磺粉，並待傷口陰乾後再行種植，亦會減少種球的腐爛。

蓮霧傷根生長緩慢
果樹施肥都要稀釋

【問】：一、蓮霧常澆豬尿，生長緩慢是何故？

二、最好施用何種肥料？

三、栽種後幾年可結果？

四、種在刺竹旁一丈處影響生長否？（彰化縣埤頭鄉竹園村竹園路六十號吳朝印）

【答】：一、蓮霧通常是用扦插繁殖，按苗時根多受傷，是初年生長緩慢的重要原因。待根系發育正常後，如土壤條件適宜，或不缺肥料，生長常很旺盛。又種植成活後祇可施少量或稀薄肥料，施用豬尿時必須加水稀釋，濃厚的肥料當可阻碍根系發育，影響生長。

二、果樹種植成活後，如欲促進生長，可用一百至二百倍硫酸水或二百至四百倍尿素水，每月施用一、二次。兩三個月後，生長即可加速。稀薄的豬尿也是好肥料。


三、蓮霧種植後如生長正常，在第三年可以開花結果。

四、凡果樹種在竹類附近均難免受其影響，可在兩者中間挖溝深溝，隔斷竹鞭蔓延；可避免或減少地下部份的影響。至於樹冠部份，應經常將過高的竹幹或竹枝予以修剪，使陽光不受阻碍，方屬適宜。（張振甫）

一四九號張維嶽

【答】：貯藏柑桔，冷藏庫以攝氏三至五度為最佳，一般貯藏庫，須保持攝氏五至八度。濕度以百分之八十至八十五為理想，因濕度過低時，易減輕果重，而濕度過高時則腐爛率提高。所以貯藏庫須注意換氣，防止因果實呼吸而引起過高的濕度。

貯藏期間視品種、採收期和成熟度而定，一般約三至五個月，貯藏愈久，出庫後腐爛愈速。（翁仁祿）




正豐農藥

為第二期作大豐收貢獻

防治水稻一般病蟲害

劑劑劑劑劑劑劑劑劑劑
乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳
松松松松松松松松松松
拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉
巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉
巴美馬P靈
綠寶銅粉劑



防治·水稻二化螟蟲

蔬菜青蟲，魚塭紅筋蟲
低毒性強力殺蟲劑
Dipterex s.p.80

地特松水溶粉劑

防治·水稻二化螟蟲及一般
害蟲柑桔果樹，蔬菜
一般害蟲

力拔山乳劑

低毒性
效驗

正豐化學股份有限公司
臺中縣 霧峯 電話63號

