



怎樣栽培 第一等品質 最高產量 的
洋蔥、馬鈴薯、蕃茄、西瓜、山東白菜、甘藍菜？

利用「萬生 MANZATE[®]」殺菌劑 是最正確可靠的方法!!

「萬生 MANZATE[®]」殺菌劑為聞名世界的美國杜邦公司所出品。含有主成份 MANEB80% 之可濕性粉劑。與水調合成噴霧液，使用於防治多種作物之病害。「萬生對作物有特別優良的附著性安全性和殺菌效力」；尤其對於多種蔬菜、果樹、花卉病害之病原菌有特殊的功效。

※洋蔥：於最初發現病斑時即開始噴藥；以後視需要情形每週噴藥一次，以防治洋蔥露菌病，紫斑病、葉枯病、銹病。藥液濃度 400 至 500 倍。

※馬鈴薯：作物生長到 2 至 6 吋高時即施藥；每公頃使用「萬生」2—5 磅藥液濃度 400—600 倍，並注意將作物充分噴射週到。病害威脅時每隔 5—10 日施藥一次，以防早疫病及晚疫病之發生。如病害猖獗時可縮短間隔時間或增加藥量。

※蕃茄：當作物結實（結球）時即開始噴藥，以後每 7 至 10 日噴藥一次，以防治蕃茄早疫病，晚疫病，葉斑病，葉霉病，炭疽病。如病害較早發生時，即在作物定植後即可開始繼續噴藥。藥液濃度 400—500 倍，並注意將作物全株充分噴射週到。

※山東白菜、小白菜、甘藍菜：使用藥液濃度 500 倍每公頃使用「萬生」4—6 磅，以防治露菌病，及黑斑病。在苗圃或直播作物，於播種後 7—10 日或病害發現時開始噴藥，以後每 3 日施藥一次。作物定植後，病害發現時開始噴藥，以後視需要情形每週噴藥一次；如病害嚴重時則 3—5 日噴藥一次。

※西瓜：使用藥液濃度 400—500 倍，以防治西瓜露菌病、蔓枯病、葉斑病、炭疽病。蔓藤開始生長後或病害威脅時則施藥。每隔 7—10 日施藥一次；如病害猖獗時則 3—5 日施藥一次。

※大豆：在播種後 50 天左右，發現病斑開始出現時，以「萬生」400 倍稀釋液則第一次噴藥，以防治紫斑病、銹病、炭疽病及露菌病；以後每隔 10 天噴射一次，至收穫前半個月止。每公頃每次使用「萬生」4—6 磅。

※其他對於各種豆類、瓜類、芹菜、菠菜、紅蘿蔔、萵苣及菸草、花卉等諸病害之防治，亦以藥液濃度 400—600 倍，每公頃使用「萬生」3—6 磅，即可獲得最佳效果。

包裝：每包 3 磅，每箱 16 包（美國原裝）。



REG. U.S. PAT. OFF.

美國杜邦公司工、農藥部

臺灣總代理：合裕貿易股份有限公司

地址：臺北市中正路一一九九號

電話：四八九一三

敬 啓 者

年 月 日

1, 我擬購「萬生 MANZATE[®]」殺菌劑 ☐ 箱 (每箱 16 包共 48 磅) ☐ 包 (每包 3 磅) 請報價。

2, 請寄下說明書：☐「依必安」殺蟲劑 ☐「卡滅克斯」除草劑
☐「萬生」殺菌劑 ☐「谷樂生」種子消毒劑

我是 ☐ 農友, ☐ 經營農場, ☐ 農業指導人員, ☐ 農藥零售商。

姓 名：

住 址：

行號或服務處：

☐ 請填明數量
☐ 請填 / 記號